

КОММУТАТОРНАЯ ДЛИНА СТЕПЕНЕЙ В СВОБОДНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ГРУПП

Вадим Ю. Березнюк Антон А. Клячко

Механико-математический факультет Московского государственного университета

Москва 119991, Ленинские горы, МГУ.

Московский центр фундаментальной и прикладной математики.

kuupzereb@gmail.com klyachko@mech.math.msu.su

Для данных групп A и B , какова минимальная возможная коммутаторная длина 2021-й (например) степени элемента свободного произведения $A * B$, не сопряжённого элементам свободных множителей? Искривляющий ответ на этот вопрос пока неизвестен, но мы можем ответить почти точно: этот минимум есть одно из двух чисел (просто зависящих от A и B). Мы рассматриваем также другие подобные задачи.

0. Введение

Хорошо известно, что в свободной группе неединичные коммутаторы не являются истинными степенями [Sch59]. Произведение двух коммутаторов в свободной группе может, разумеется, оказаться квадратом неединичного элемента, а может даже оказаться кубом, как заметил Каллер [Cull81]: $[a, b]^3 = [a^{-1}ba, a^{-2}bab^{-1}][bab^{-1}, b^2]$. Это равенство выполнено в свободной группе $F(a, b)$ и, следовательно, для любых элементов a и b любой группы. Более того, в работе [Cull81] показано, что $[a, b]^n$ в свободной группе $F(a, b)$ раскладывается в произведение k коммутаторов, если $n \leq 2k - 1$.

Для свободной группы оценка Каллера не может быть улучшена ни в каком смысле:

если для каких-то элементов x_i, y_i, z какой-то свободной группы выполнняется равенство $[x_1, y_1] \dots [x_k, y_k] = z^n$, где $n \geq 2k$, то $z = 1$.

Этот замечательный факт был доказан в [CCE91] для $k = 2$ и в [DH91] в общем случае. В той же работе [DH91] доказано аналогичное утверждение для свободных произведений локально индикабельных групп (то есть групп, в которых каждая нетривиальная конечно порождённая подгруппа допускает эпиморфизм на \mathbb{Z}). А позже выяснилось, что это утверждение остаётся верным в свободных произведениях вообще любых групп без кручения:

если для каких-то элементов x_i, y_i, z свободного произведения каких-то групп без кручения выполняется равенство $[x_1, y_1] \dots [x_k, y_k] = z^n$, где $n \geq 2k$, то z сопряжён элементу одного из свободных множителей.

Это было показано в [Ch18] и [IK18] (независимо). При этом в обеих работах отмечено, что все рассуждения остаются верными, если условие отсутствия кручения заменить на более слабое условие отсутствие маленького кручения. Однако рассуждения в работах [Ch18] и [IK18] разные:

- рассуждение Чена основано на подходе Калегари [Cal09],
 - а рассуждение в [IK18] основано на лемме о столкновениях [K93],
- поэтому результаты в [Ch18] и [IK18] для групп с кручением получились разные (и даже, что забавно, несравнимые — ни про один из них нельзя сказать, что он сильнее другого):

пусть для элементов x_i, y_i, z свободного произведения каких-то групп без неединичных элементов порядка, меньшего N ,
выполняется равенство $[x_1, y_1] \dots [x_k, y_k] = z^n$; тогда z сопряжён элементу одного из свободных множителей,

$$\text{если } \begin{cases} n \geq 2k + \lceil \frac{2n}{N} \rceil & [\text{Ch18}] \quad (\text{здесь и далее } [x] \stackrel{\text{определ}}{=} \max\{p \in \mathbb{Z} \mid p \leq x\}) \\ \text{или} \\ n \geq 2k \text{ и } N > n & [\text{IK18}]. \end{cases} \quad (*)$$

В настоящей работе показано, что условие $(*)$ можно заменить на более слабое условие

$$n \geq 2k + 2 \left\lceil \frac{n}{N} \right\rceil. \quad (**)$$

Нетрудно сообразить, что это усиливает и результат работы [Ch18], и результат работы [IK18]. Более того, полученную оценку, если и можно улучшить, то только чуть-чуть. А именно, ситуация следующая.

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках реализации программы Московского центра фундаментальной и прикладной математики по соглашению № 075-15-2019-1621, а также Российского фонда фундаментальных исследований, грант № 19-01-00591.

Пусть имеется группа G с фиксированным разложением в свободное произведение: $G = \ast_{j \in J} A_j$. Определим число $k(G, n)$, как минимальное $k \in \mathbb{Z}$ такое, что n -я степень некоторого элемента, не сопряжённого элементам из $\bigcup_{j \in J} A_j$, раскладывается в произведение k коммутаторов. И пусть $N(G)$ — минимальный порядок неединичного элемента группы G . Таким образом, согласно $(**)$ любое свободное произведение G удовлетворяет неравенству $k(G, n) \geqslant \left[\frac{n}{2} \right] - \left[\frac{n}{N(G)} \right] + 1$. Это оценка представляет собой почти окончательный ответ: теорема 1 (смотрите следующий параграф) утверждает, в частности, что

для любого свободного произведения $G = \ast_{j \in J} A_j$ величина $k(G, n)$ — это одно из двух чисел:

$$\left[\frac{n}{2} \right] - \left[\frac{n}{N(G)} \right] + 1 \quad \text{или} \quad \left[\frac{n}{2} \right] - \left[\frac{n}{N(G)} \right] + 2.$$

Приравняв $k(G, n)$ к единице, мы получим известный факт [CER94]:

коммутатор, не сопряжённый элементам свободных сомножителей группы G , может быть истинной степенью, только если $N(G) = 2$ или $N(G) = 3$, причём в последнем случае этот коммутатор может быть только кубом.

Для больших $k(G, n)$ наш результат является (по-видимому) новым.

На самом деле, мы изучаем уравнения, более общие, чем уравнение $[y, z][t, u] \dots = x^n$, про которое мы пока говорили:

- вместо степени x^n мы рассматриваем «обобщённую степень», то есть произведение сопряжённых между собой элементов;
- а вместо произведения коммутаторов мы рассматриваем произведение коммутаторов и элементов, сопряжённых элементам свободных сомножителей.

Основная теорема (упрощённая форма). Пусть в свободном произведении групп $G = \ast_{j \in J} A_j$ нет неединичных элементов порядка, меньшего, чем N , и имеет место равенство

$$c_1 \dots c_k d_1 \dots d_l = u_1^{n_1} \dots u_m^{n_m},$$

где c_i — коммутаторы, d_i сопряжены элементам из $\bigcup_{j \in J} A_j$, элементы u_i сопряжены между собой и не сопряжены элементам из $\bigcup_{j \in J} A_j$, и n_i — натуральные числа. Тогда

$$2k + l \geqslant \sum_{i=1}^m (n_i - 1) - 2 \left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^m n_i \right] + 2.$$

Этот результат значительно усиливает ранее известные факты на эту тему:

$$\text{в условиях основной теоремы } 2k + l \geqslant \begin{cases} \sum_{i=1}^m (n_i - 1) - \left[\frac{2}{N} \sum_{i=1}^m n_i \right] + 2, & \text{если } l = 0 \\ \sum_{i=1}^m (n_i - 1) + 2, & \text{если } N > \sum_{i=1}^m n_i \end{cases} \quad [\text{Ch18}; \text{IK18}].$$

Из основной теоремы немедленно вытекает то, что мы говорили выше про неравенство $(**)$.

Следствие 1. Пусть в свободном произведении групп $G = \ast_{j \in J} A_j$ имеет место равенство $c_1 \dots c_k = u^n$, где c_i — коммутаторы, а u не сопряжён элементам свободных сомножителей. Тогда $2k \geqslant n - 2 \left[\frac{n}{N} \right] + 1$ (или, что тоже самое, $k \geqslant \left[\frac{n}{2} \right] - \left[\frac{n}{N} \right] + 1$).

Приведённая выше формулировка основной теоремы несколько упрощённая. На самом деле, мы доказываем более сильное неравенство при более слабых предположениях. Полную формулировку этой теоремы и её доказательство можно найти в последнем параграфе. В параграфе 2 мы выводим из основной теоремы теорему 1 о минимальной коммутаторной длине степеней, упомянутую выше. Параграфы 3 и 4 содержат необходимые сведения о диаграммах Хауди и о движениях на поверхностях, то есть о лемме о столкновениях. Эта лемма из [K93] (или её варианты) уже применялась в [FK12] и [IK18] к задачам, связанным с коммутаторной длиной (а, например, в [K93], [ClG95], [FeR96], [Кл05], [Кл06а], [Кл06б], [Кл07], [Cl03], [ClG01], [CoR01], [FoR05a],

[FoR05b], [Kl09], [Le09] и [KIL12] она применялась к разным другим задачам). Нам понадобится некоторый новый вариант леммы о столкновениях, о котором речь пойдёт в параграфе 4. Забавно, что существенную роль в этом параграфе играет *задача о справедливом делении*, смотрите, например, [Me06].

Наши обозначения в целом стандартны. Отметим только, что если $k \in \mathbb{Z}$, а x и y — элементы некоторой группы, то x^y , x^{ky} и x^{-y} обозначают $y^{-1}xy$, $y^{-1}x^ky$ и $y^{-1}x^{-1}y$, соответственно. Коммутатор $[x, y]$ мы понимаем как $x^{-1}y^{-1}xy$. Символом $\text{cl}(g)$ мы обозначаем *коммутаторную длину* элемента g группы, то есть $\text{cl}(g)$ есть наименьшее целое k такое, что g раскладывается в произведение k коммутаторов (и $\text{cl}(1) = 0$). Слово «поверхность» всегда понимается, как замкнутая поверхность (необязательно связная). Эйлерову характеристику поверхности S мы обозначаем $\chi(S)$. Буквы \mathbb{R} , \mathbb{Z} и \mathbb{N} обозначают множества вещественных, целых и натуральных (целых положительных) чисел, соответственно. Символом $[x]$ мы обозначаем целую часть вещественного числа x (то есть $[x]$ — это наибольшее целое, не превосходящее x).

1. Степени с маленькой коммутаторной длиной

Оценку Каллера, о которой шла речь в самом начале введения, можно сформулировать следующим образом.

Неравенство Каллера [Cull81]. Для любых элементов a и b любой группы и любого $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$

$$\text{cl}([a, b]^n) \leq \left[\frac{n}{2} \right]_c + 1, \quad \text{где } [x]_c \stackrel{\text{опр}}{=} \begin{cases} [x], & \text{если } x \neq 0; \\ -1, & \text{если } x = 0. \end{cases}$$

Лемма 1. Если a и b — элементы какой-то группы и $m \in \mathbb{N}$, то элемент $(ab)^m$ сопряжён элементу вида $a^m b^m c_1 c_2 \dots c_{[\frac{m}{2}]}$, где $c_i \in G$ — коммутаторы.

Доказательство.

$$\begin{aligned} a^l(ba)^s b^l \cdot [a^{l-2}b^{l-1}, b^{2-l}a^{1-l}] &= \\ &= a^l(ba)^s b^l \cdot b^{1-l}a^{2-l}a^{l-1}b^{l-2}a^{l-2}b^{l-1}b^{2-l}a^{1-l} = a^l(ba)^s bab^{l-2}a^{l-2}ba^{1-l} \sim a^{l-2}ba(ba)^s bab^{l-2} = a^{l-2}(ba)^{s+2}b^{l-2}. \end{aligned}$$

Очевидная индукция показывает, что для некоторых коммутаторов c_i элемент $a^m b^m c_1 c_2 \dots c_{[\frac{m}{2}]}$ сопряжён элементу $(ba)^m$, если число m чётно, или элементу $a(ba)^{m-1}b$, если число m нечётно, что и требовалось (поскольку $a(ba)^{m-1}b = (ab)^m \sim (ba)^m$, где символ \sim означает сопряжённость).

Лемма 2. Если a и b — элементы некоторой группы, m и s — натуральные числа, и $a^m = b^m = 1$, то $\text{cl}((ab)^{ms}) \leq s([m/2] - 1) + [s/2]_c + 1$.

Доказательство. Заметим, что для любого неединичного элемента g коммутанта любой группы и для любого $s \in \mathbb{N} \cup \{0\}$

$$\text{cl}(g^s) \leq s(\text{cl}(g) - 1) + \left[\frac{s}{2} \right]_c + 1.$$

Действительно, представим элемент g в виде $g = ch$, где c — коммутатор, а $\text{cl}(h) = \text{cl}(g) - 1$, получим

$$\text{cl}(g^s) = \text{cl}((ch)^s) = \text{cl}(c^s h^{c^{s-1}} h^{c^{s-2}} \dots h^c h) \leq \text{cl}(c^s) + s \cdot \text{cl}(h) \leq \left[\frac{s}{2} \right]_c + 1 + s(\text{cl}(g) - 1) \quad (\text{по неравенству Каллера}).$$

Это завершает доказательство, поскольку по лемме 1 $\text{cl}((ab)^m) \leq [m/2]$.

Теорема 1. Для любого свободного произведения $G = *_{j \in J} A_j$ и любого $n \in \mathbb{N}$ выполняется одно из равенств:

$$k(G, n) = \left[\frac{n}{2} \right] - \left[\frac{n}{N(G)} \right] + 1 \quad \text{или} \quad k(G, n) = \left[\frac{n}{2} \right] - \left[\frac{n}{N(G)} \right] + 2,$$

где $k(G, n) := \min \left\{ \text{cl}(g^n) \mid g \in G, g \text{ не сопряжён элементам из } \bigcup_{j \in J} A_j \right\}$ и $N(G) \stackrel{\text{опр}}{=} \min \{ |\langle g \rangle| \mid g \in G \setminus \{1\}\}$.

При этом $k(G, n) = \left[\frac{n}{2} \right] - \left[\frac{n}{N(G)} \right] + 1$, если выполнено хотя бы одно из следующих условий:

- а) n чётно, а $\left[\frac{n}{N(G)} \right]$ нечётно;
- б) n делится на $N(G)$;
- в) $n \leq N(G)$;
- г) $N(G) = 2$.

Доказательство. Число $N(G)$, разумеется, либо простое, либо бесконечное. Для $N(G) = 2$ утверждение выполнено, потому что группа G в этом случае содержит бесконечную диэдральную подгруппу, всякий элемент коммутанта которой является коммутатором (и не сопряжён элементам свободных сомножителей). Для $N(G) = \infty$

рассуждения, приведённые ниже проходят, но мы не будем на этом останавливаться, поскольку утверждение теоремы в этом случае немедленно вытекает из результатов работ [Ch18] и [IK18], упомянутых во введении. Таким образом, считаем, что число $N(G)$ нечётное.

Если $z^m = 1$, то мы имеем два неравенства:

$$\text{cl}([x, y]^m) \leq \left[\frac{m}{2} \right]_c + 1 \quad \text{и} \quad \text{cl}([z, u]^{ms}) \leq s \left(\left[\frac{m}{2} \right] - 1 \right) + \left[\frac{s}{2} \right]_c + 1, \quad (***)$$

Первое неравенство — это оценка Каллера, а второе — лемма 2.

Рассмотрим в группе G коммутатор $[z, u]$, где $z^{N(G)} = 1$, а u не лежит в том же свободном сомножителе, что z . Разделим n на $N = N(G)$ с остатком: $n = rN + t$, где $0 \leq t < N$ (а $r = \left[\frac{n}{N} \right]$). Обозначим символами $\Delta_0(a, b, \dots)$ и $\Delta_{neu}(a, b, \dots)$ число нулей и число нечётных чисел в наборе (a, b, \dots) . Тогда для нечётного N мы получим

$$\begin{aligned} k(G, n) &\leq \text{cl}([z, u]^n) = \text{cl}([z, u]^{rN+t}) \leq \text{cl}([z, u]^{rN}) + \text{cl}([z, u]^t) \stackrel{(***)}{\leq} \left(r \left(\left[\frac{N}{2} \right] - 1 \right) + \left[\frac{r}{2} \right]_c + 1 \right) + \left(\left[\frac{t}{2} \right]_c + 1 \right) = \\ &= \left(r \left(\frac{N-1}{2} - 1 \right) + \left[\frac{r}{2} \right]_c + 1 \right) + \left(\left[\frac{n-rN}{2} \right]_c + 1 \right) = \\ &= r \left(\frac{N-1}{2} - 1 \right) + \frac{r}{2} + 1 + \frac{n-rN}{2} + 1 - \Delta_0(r, n-rN) - \frac{1}{2} \Delta_{neu}(r, n-rN) = \\ &= \frac{n}{2} - r + 2 - \Delta_0(r, n-rN) - \frac{1}{2} \Delta_{neu}(r, n-rN) = \\ &= \left[\frac{n}{2} \right] - r + 2 - \Delta_0(r, n-rN) - \frac{1}{2} (\Delta_{neu}(r, n-rN) - \Delta_{neu}(n)) = \\ &= \left[\frac{n}{2} \right] - r + 2 - \Delta_0(r, n-rN) - \Delta_{neu}(r) (1 - \Delta_{neu}(n)) = \begin{cases} \left[\frac{n}{2} \right] - r + 1, & \text{если выполнено а), б) или в);} \\ \left[\frac{n}{2} \right] - r + 2 & \text{в остальных случаях.} \end{cases} \end{aligned}$$

Сопоставляя это со следствием 1, мы приходим к выводу, что теорема 1 доказана (по модулю основной теоремы).

2. Диаграммы Хаус

Пусть имеется замкнутая ориентированная поверхность S (возможно, несвязная) и (неориентированный) конечный граф Γ , который вложен в поверхность S и разбивает её на односвязные области. Такой граф задаёт клеточное разбиение поверхности S , то есть отображение M , называемое *картой* на S :

$$M: \bigsqcup_{i=1}^m D_i \rightarrow S, \quad \text{где } D_i \text{ — двумерные диски,}$$

такое, что

- отображение M непрерывно, сюръективно, инъективно на внутренности (то есть на $\bigsqcup_{i=1}^m (D_i \setminus \partial D_i)$);
 - прообраз каждой точки конечен, а прообраз графа Γ есть объединение границ граней: $M^{-1}(\Gamma) = \bigsqcup_{i=1}^m \partial D_i$.
- Прообразы вершин графа Γ называют *углами* карты и говорят, что угол c находится *при* вершине v , если $M(c) = v$. Вершины и рёбра графа Γ называют *вершинами* и *ребрами* карты M . Диски D_i называют *гранями* или *клетками* карты. Такую карту мы называем *диаграммой* над свободным произведением $A * B$, если
- график Γ двудольный, то есть вершины разделены на два класса: A -вершины и B -вершины, и каждое ребро соединяет A -вершину с B -вершиной;
 - углы при A -вершинах помечены элементами группы A , а углы при B -вершинах помечены элементами группы B ;
 - некоторые вершины выделены и называются *внешними*, остальные вершины называются *внутренними*;
 - метка каждой внутренней A -вершины равна единице в группе A , а метка каждой внутренней B -вершины равна единице в группе B , где под *меткой вершины* понимается произведение меток углов при этой вершине, перечисленных по часовой стрелке (таким образом, метка вершины определена с точностью до сопряжённости в группах A и B).

Подобные диаграммы рассматривались в [How83], [How90], [K93], [Le09] и многих других работах, но наши определения слегка отличаются и соответствуют определениям из [IK18] (за исключением того, что в [IK18] внешние и внутренние вершины называются иррегулярными и регулярными).

Метка грани такой диаграммы определяется естественным образом как произведение меток всех углов этой грани против часовой стрелки. Метка грани представляет собой элемент свободного произведения $A * B$, определённый с точностью до сопряжённости.

Например, на рисунке 1 изображена диаграмма на торе (который нарисован в виде прямоугольника с отождествлёнными противоположными сторонами), содержащая две вершины, три ребра, одну грань и шесть углов с метками $a \in A$ и $b \in B$. Если вершины внутренние, то a^3 должно быть равно единице в группе A , а b^3 должно быть равно единице в группе B . Метка грани здесь равна $(ab)^3$. Эта диаграмма показывает, что куб произведения двух элементов порядка три всегда является коммутатором (в любой группе).




Рис. 1

3. Движения

Этот параграф по сути повторяет соответствующий параграф из работы [FK12] (и [IK18]) и состоит из определений и утверждений, которые мы позаимствовали из [Кл05] (слегка упростив их применительно к интересующему нас случаю).

Пусть на замкнутой ориентированной поверхности S имеется карта M , соответствующая графу $\Gamma \subset S$. Автомобилем, обезжающим грань D этой карты, называют сохраняющий ориентацию гомеоморфизм из ориентированной окружности R (окружности времени) в границу ∂D грани D .

Если число автомобилей, оказавшихся в момент времени t в точке $p \in \Gamma$, равно степени d этой точки, то мы говорим, что в точке p в момент t происходит *полное столкновение* (степени d), а точку p называем *точкой полного столкновения* (степени d). Здесь *степенью* точки $p \in \Gamma$ мы называем число рёбер, инцидентных вершине p , если p является вершиной; если же p не является вершиной (то есть, если p — внутренняя точка ребра), то мы считаем, что $\deg p = 2$.

Обращаем внимание, что согласно этому определению вершина степени один (то есть тупик), в которую заезжает хоть один автомобиль, всегда является точкой полного столкновения.

Кратным движением периода T на карте M называется набор автомобилей $\alpha_{D,j}: R \rightarrow \partial D$, где $j = 1, \dots, d_D$, такой что

- 1) $d_D \geq 1$ для любой грани D (то есть каждую грань обезжают по крайней мере один автомобиль);
- 2) $\alpha_{D,j}(t+T) = \alpha_{D,j+1}(t)$ для любого $t \in R$ и $j = \{1, \dots, d_D\}$ (здесь индексы берутся по модулю d_D , а сложение точек окружности R производится естественным образом: $R = \mathbb{R}/P\mathbb{Z}$);
- 3) существует такое разбиение каждой из окружностей ∂D на d_D дуг (с непересекающимися внутренностями), что на протяжении интервала $[0, T]$ каждый автомобиль $\alpha_{D,j}$ движется по j -й дуге.

Говоря по-простому, границу ∂D каждой грани D обезжают несколько (d_D) автомобилей против часовой стрелки (внутренность грани остается слева от автомобиля), не разворачиваясь и не останавливаясь. При этом движение периодично в том смысле, что граница грани разбита на d_D участков, и за период каждый автомобиль проезжает свой участок (и, таким образом, по прошествии периода автомобили меняются местами).

Лемма о столкновениях (для кратных движений) [Кл05], [Кl97]. Для любого кратного движения на карте на замкнутой ориентированной поверхности S число точек полного столкновения не меньше чем $\chi(S) + \sum_D (d_D - 1)$, где сумма распространяется на все грани карты.

В упомянутых работах эта лемма была сформулирована и доказана для связных поверхностей, но она остаётся верной и в несвязном случае по очевидным причинам — и левая, и правая часть неравенства аддитивна относительно несвязного объединения.

Рассмотрим, например, такое движение на одноклеточной карте на торе, изображённой на рисунке 1: три автомобиля обезжают единственную имеющуюся грань с постоянной скоростью одно ребро в минуту, а в нулевой момент времени эти три автомобиля находятся в трёх разных углах с меткой a . На рисунке 1 изображено положение автомобилей в момент времени $t = 1/3$. Это периодическое движение с периодом две минуты. Полные столкновения происходят в обеих вершинах карты, а вне вершин (то есть во внутренних

точках рёбер) столкновений нет. Лемма о столкновениях говорит, что должно выполняться неравенство

$$\left(\begin{array}{c} \text{число точек полного столкновения,} \\ \text{то есть } 2 \end{array} \right) \geqslant \left(\begin{array}{c} \text{эйлерова характеристика тора,} \\ \text{то есть } 0 \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} d_D, \text{ то есть число автомобилей,} \\ \text{объезжающих единственную грань } D, \\ \text{то есть } 3 \end{array} \right) - 1,$$

которое в данном случае оказалось равенством.

4. Кластеры

Идея кластеров состоит в том, что, столкновения, происходящие близко друг от друга, можно трактовать, как одно столкновение; таким образом, модифицированная лемма о столкновениях (лемма о кластерах,смотрите ниже) говорит, что не только число точек полного столкновения достаточно велико, велико также число точек полного столкновения, находящихся далеко друг от друга.

Пусть имеется кратное движение с периодом T на некоторой карте на поверхности, причём все автомобили движутся с одинаковой постоянной скоростью одно ребро в минуту.

Набор K точек полного столкновения назовём *кластером* с центром $v \in K$, если каждую точку $w \in K$ посещает хотя бы один из автомобилей, сталкивающихся в точке v , в течении менее, чем $T/2$ минут после столкновения в точке v . Автомобили, сталкивающиеся в центре v кластера K , мы называем *связывающими автомобилями* кластера K , а пути (длины $< T/2$), по которым эти автомобили едут из центра кластера в другие его точки, мы называем *связывающими путями* кластера K . Мы называем набор кластеров *независимым*, если центр никакого из этих кластеров не лежит на связывающих путях других кластеров этого набора.

В формулировке леммы о кластерах (смотрите ниже) используется *функция справедливого деления* $\mathbf{fp}(\mathcal{M})$ мульти множества \mathcal{M} , состоящего из натуральных чисел:

$$\mathbf{fp}(\mathcal{M}) \stackrel{\text{оп}}{=} \min \left\{ \max \left(\sum_{i \in \mathcal{A}} i, \sum_{i \in \mathcal{M} \setminus \mathcal{A}} i \right) \mid \mathcal{A} \subseteq \mathcal{M} \right\}. \quad \text{Например, } \mathbf{fp}(10, 4, 4, 3, 2) = \max(10 + 2, 4 + 4 + 3) = 12.$$

Задачу нахождения такого справедливого деления называют иногда «самой лёгкой из NP-трудных задач» [Ме06]. Нам понадобится простейший пример такого вычисления:

$$\mathbf{fp}\left(\underbrace{1, 1, 1, 1, 1 \dots, 1}_{\min(l, \kappa) \text{ штук}}, \underbrace{N, N, \dots, N}_{\kappa \text{ штук}}\right) = \begin{cases} \left[\frac{\kappa+1}{2} \right], & \text{если } \kappa \leq l; \\ \left[\frac{l+1}{2} \right] + N \cdot \frac{\kappa-l}{2}, & \text{если } \kappa > l \text{ и } \kappa - l \text{ чётно}; \\ \left[\frac{l+1-\min(l, N)}{2} \right] + N \cdot \frac{\kappa-l+1}{2}, & \text{если } \kappa > l \text{ и } \kappa - l \text{ нечётно}. \end{cases} \quad (1)$$

Это верно для всех $\kappa, N \in \mathbb{N}$ и $l \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. Дело в том, что при справедливом делении такого мульти множества \mathcal{M} на две части: $\mathcal{M} = \mathcal{A} \sqcup \mathcal{B}$, самым разумным будет поступить так:

- поделить большие элементы (то есть равные N) поровну (насколько возможно), то есть $[(\kappa - l)/2]$ этих элементов включить в \mathcal{A} (при $\kappa > l$);
- а маленькими элементами (то есть единичками) попытаться, насколько возможно, скомпенсировать разницу между \mathcal{A} и \mathcal{B} (которая возникает при нечётном $\kappa - l$);
- если разница будет скомпенсирована, а единички ещё останутся, то их надо поделить поровну (насколько возможно).

Доказательство мы оставляем читателям в качестве несложного упражнения, на рисунках 2 и 3 изображены все возможные случаи ($f = \mathbf{fp}\left(\underbrace{1, 1, 1, 1, 1 \dots, 1}_{\min(l, \kappa) \text{ штук}}, \underbrace{N, N, \dots, N}_{\kappa \text{ штук}}\right)$ на этих рисунках).




Рис. 2




Рис. 3

Мы называем кратное движение *равномерным*, если все автомобили движутся с одинаковой постоянной скоростью одно ребро в минуту и в начальный момент находятся в некоторых вершинах.

Лемма о кластерах. Пусть имеется кратное равномерное движение на некоторой карте на некоторой ориентированной замкнутой поверхности S , и множество точек полного столкновения Π этого движения разбито на минимальное возможное число κ независимых кластеров: $\Pi = \bigsqcup_{i=1}^{\kappa} K_i$. Тогда

- a) $\kappa \geq \chi(S) + \sum_D (d_D - 1)$, где сумма распространяются на все грани карты;
- б) если всего имеется n точек полного столкновения, и их степени суть $N_1 \leq \dots \leq N_n$, то число автомобилей этого движения (то есть $\sum_D d_D$, где сумма распространяются на все грани карты) удовлетворяет неравенству $\sum_D d_D \geq \max(\mathbf{fp}(N_1, \dots, N_\kappa), N_n)$; в частности, если все точки полного столкновения имеют степень не меньше N , то $\sum_D d_D \geq [\frac{\kappa+1}{2}] \cdot N$.

Доказательство. Будем считать, что все столкновения происходят в вершинах. Этого можно добиться дополнительным разделением всех рёбер на две половины с помощью новых вершин степени два (и замедлением

всех автомобилей).

Докажем первое утверждение. Для каждого кластера $K = K_i$ с центром $v = v_i$ рассмотрим минимальное множество связывающих путей $\pi_j = \pi_{ij}$, объединение которых содержит все точки кластера K . Минимальность означает, что для каждого связывающего автомобиля имеется не более одного пути π_j , лежащего на границе клетки $D_j = D_{ij}$, которую обезжает этот автомобиль. По определению кластера длина τ_j пути π_j меньше $T/2$.

Соединим начало и конец пути π_j внутри клетки D_j путём π'_j такой же длины (то есть «удвоим» путь π_j). (Отметим, что когда мы проделаем эту операцию для всех рассматриваемых кластеров, внутри некоторых клеток может возникнуть несколько хорд, но эти хорды не будут пересекаться, поскольку рассматриваемые кластеры независимы.)

Клетка D_j превратится в две клетки (смотрите рисунок 4, слева):

- *большая* клетка D'_j такого же периметра, как исходная клетка D_j
- *маленькая* клетка Γ_j периметра $2\tau_j$.




Рис. 4

Движение автомобилей, обезжающих большие клетки, мы определим так же, как движение обезжающих исходные клетки D_j , но вместо пути π_j соответствующие автомобили будут ехать по его дублёрю π'_j .

Движение автомобилей, обезжающих маленькие клетки, мы определим чуть позже; а пока опишем, как устроено движение уже имеющихся автомобилей на границах этих клеток. Граница каждой маленькой клетки $\Gamma = \Gamma_j$ имеет длину $2\tau_j$ и состоит из трёх участков (перечисляемых против часовой стрелки,смотрите рисунок 4, справа):

- участок **a** = π'_j длины $\tau = \tau_j$; по этому участку движется связывающий автомобиль в течении времени $0 \leq t \leq \tau$ (для упрощения обозначений мы считаем, что полное столкновение в точке v_i происходит в нулевой момент времени; в других случаях следует внести очевидные изменения); участок **a** заканчивается в углу c при центре v_i кластера K_i ;
- участок **b** длины один (это первое ребро пути π_j), начинающийся в углу c ; по этому участку движется (другой) связывающий автомобиль кластера K_i в течении времени $-1 \leq t \leq 0$;
- участок **c** длины $|c| = \tau - 1$, по которому едут какие-то автомобили, про которые мы ничего не знаем; но раз $\tau < T/2$, стало быть, $|c| = \tau - 1 < T - \tau - 1$; а это означает, что

на участке **c** (включая его концы) нет ни одного автомобиля, в некоторый момент времени $\tau < t < T - 1$ и даже в некоторый подпромежуток Δ_Γ (положительной продолжительности) промежутка времени $\tau < t < T - 1$

(поскольку промежуток времени $\tau < t < T - 1$ имеет продолжительность $T - 1 - \tau > |c|$, а все автомобили едут с единичной скоростью). Отметим ещё, что ничто нам не мешает выбрать промежутки времени Δ_Γ непересекающимися для разных маленьких клеток Γ :

$$\Delta_\Gamma \cap \Delta_{\Gamma'} = \emptyset \quad \text{при } \Gamma \neq \Gamma'.$$

Определим теперь движение нового автомобиля α_Γ , обезжающего границу маленькой клетки $\Gamma = \Gamma_j$:

- в нулевой момент времени автомобиль α_Γ находится в углу c (и участвует в полном столкновении в точке v_i);
- далее автомобиль α_Γ (медленно) движется по участку **b** (ни с кем не сталкиваясь, поскольку тот (связывающий) автомобиль, с которым только и можно столкнуться на участке **b**, только что с него выехал, встретившись с нашим автомобилем α_Γ в точке v_i , так что на этом участке находится безопасно до момента $T - 1$);
- а в промежуток времени Δ_Γ (который начинается раньше, чем $T - 1$, по определению Δ_Γ) автомобиль α_Γ (быстро) проезжает участок **c**, опять ни с кем не сталкиваясь, поскольку на этом участке никого нет в промежуток времени Δ_Γ по определению Δ_Γ (и так как $\Delta_\Gamma \cap \Delta_{\Gamma'} = \emptyset$ при $\Gamma \neq \Gamma'$);
- таким образом автомобиль α_Γ оказывается на участке **a** позже, чем в момент τ (опять по определению промежутка Δ_Γ); значит, связывающий автомобиль, с которым можно было бы столкнуться на этом участке, уже уехал с него, и наш автомобиль α_Γ благополучно без столкновений добирается до угла c к концу периода.

Мы построили периодическое движение на некоторой карте на поверхности S , причём полных столкновений теперь ровно \varkappa , а сумма $\sum_D (d_D - 1)$ по всем граням осталась такой же, как на исходной карте (так как каждую маленькую грань Γ_j обежаёт один автомобиль, то есть $d_{\Gamma_j} = 1$). Для завершения доказательства пункта а) остаётся сослаться на лемму о столкновениях.

Чтобы доказать утверждение б), разделим период времени $I = \{t \mid 0 \leq t < T\}$ на два полупериода: $I = I_1 \sqcup I_2$, где $I_1 = \{t \mid 0 \leq t < T/2\}$ и $I_2 = \{t \mid T/2 \leq t < T\}$.

Периодичность движения означает, что в каждой точке происходит не более одного полного столкновения в течении периода I . Поэтому, множество точек полного столкновения $\Pi = \{p_1, \dots, p_n\}$ разделится на два

подмножества: $\Pi = \Pi_1 \sqcup \Pi_2$, а мульти множества $\mathcal{N} = (N_1, \dots, N_n)$ степеней этих точек — на два подмультимножества:

$$\mathcal{N} = \mathcal{N}_1 \sqcup \mathcal{N}_2, \quad \text{где } \mathcal{N}_i = (\text{степени точек полных столкновений, происходящих в моменты времени из } I_i).$$

Пусть множество Π_i можно разбить на \varkappa_i независимых кластеров, и нельзя разбить на меньшее число независимых кластеров. Тогда $\varkappa_1 + \varkappa_2 \geq \varkappa$ (поскольку множество Π разбивается на $\varkappa_1 + \varkappa_2$ независимых кластеров, а по условию его нельзя разбить меньше, чем на \varkappa независимых кластеров).

Множество точек полного столкновения мы называем *независимым*, если множества сталкивающихся в этих точках автомобилей в течении периода I попарно не пересекаются.

Сосредоточимся теперь на множестве Π_1 . Пусть

- $v_1 \in \Pi_1$ — это точка, в которой происходит первое (по времени) столкновение (если такая точка v_1 существует);
- $v_2 \in \Pi_1$ — это точка, в которой происходит первое (по времени) столкновение такое, что $\{v_1, v_2\}$ независимы (если такая точка v_2 существует);
- $v_3 \in \Pi_1$ — это точка, в которой происходит первое (по времени) столкновение такое, что $\{v_1, v_2, v_3\}$ независимы (если такая точка v_3 существует);
- ...

Точек v_i наберётся не меньше, чем \varkappa_1 , поскольку иначе множество Π_1 разбивалось бы на меньшее, чем \varkappa_1 , число независимых кластеров (например, если v_1 и v_2 нашлись, а v_3 не существует, то каждая точка из Π_1 окажется либо в кластере с центром v_1 , либо в кластере с центром v_2).

Таким образом, множество Π_1 содержит независимые точки $v_1, \dots, v_{\varkappa_1}$, а множество Π_2 содержит независимые точки $w_1, \dots, w_{\varkappa_2}$ (по аналогичным причинам). Значит, число всех имеющихся автомобилей не меньше, чем

$$\max \left(\sum \deg v_i, \sum \deg w_i \right) \geq \mathbf{fp}(\deg v_1, \dots, \deg v_{\varkappa_1}, \deg w_1, \dots, \deg w_{\varkappa_2}) \geq \mathbf{fp}(N_1, \dots, N_{\varkappa})$$

(где последнее неравенство немедленно вытекает из того, что $\varkappa_1 + \varkappa_2 \geq \varkappa$ и $N_1 \leq \dots \leq N_n$).

Это и есть доказываемая оценка, поскольку неравенство $\sum_D d_D \geq N_n$ очевидно (раз в какой-то точке сталкиваются N_n автомобилей, стало быть, N_n автомобилей существуют).

Из леммы о кластерах вытекает следующее утверждение (в котором кластеры не упоминаются вовсе).

Следствие леммы о кластерах. Пусть кратное равномерное движение на некоторой карте на некоторой ориентированной замкнутой поверхности S имеет всего n точек полного столкновения, и их степени суть $N_1 \leq \dots \leq N_n$. Тогда число автомобилей этого движения (то есть $\sum_D d_D$, где сумма распространяется на все грани карты) удовлетворяет неравенству

$$\sum_D d_D \geq \max(\mathbf{fp}(N_1, \dots, N_{\varkappa}), N_n), \quad \text{где } \varkappa = \chi(S) + \sum_D (d_D - 1) \quad (\text{эта величина никогда не превосходит } n). \quad (2)$$

Кроме того, для всех $l \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ выполняется неравенство

$$\chi(S) - l + \sum_D (d_D - 1) \leq \begin{cases} 2 \left[\frac{1}{N_{l+1}} \left(\sum_D d_D - \left[\frac{l+1}{2} \right] \right) \right], & \text{если число } \sum_D (d_D - 1) - l \text{ чётно;} \\ 2 \left[\frac{1}{N_{l+1}} \left(\sum_D d_D - \left[\frac{l+1-N_{l+1}}{2} \right] \right)_+ \right] - 1, & \text{если число } \sum_D (d_D - 1) - l \text{ нечётно,} \end{cases} \quad (3)$$

где $[x]_+ \stackrel{\text{определ}}{=} \max([x], 0)$ и $N_i = \infty$ при $i > n$ (в частности, при $N_{l+1} = \infty$ правая часть есть 0 или -1).

Доказательство. Для доказательства неравенства (2) достаточно подставить оценку из пункта а) леммы о кластерах в оценку из пункта б) (воспользовавшись тем, что функция справедливого деления $\mathbf{fp}(N_1, \dots, N_{\varkappa})$ очевидным образом не убывает, как функция от \varkappa).

Докажем (3). Воспользовавшись монотонностью функции \mathbf{fp} по каждому из аргументов и формулами (2)

и (1), при $\varkappa = \chi(S) + \sum_D (d_D - 1)$ мы получаем

$$\sum_D d_D \stackrel{(2)}{\geq} \max(\mathbf{fp}(N_1, \dots, N_\varkappa), N_n) \geq \mathbf{fp}\left(\underbrace{1, 1, 1, 1, \dots, 1}_{\min(l, \varkappa) \text{ штук}}, \underbrace{N_{l+1}, N_{l+1}, \dots, N_{l+1}}_{\varkappa \text{ штук}}\right) \stackrel{(1)}{=} \varkappa$$

$$\stackrel{(1)}{=} \begin{cases} \left[\frac{\varkappa+1}{2}\right], & \text{если } \varkappa \leq l; \\ \left[\frac{l+1}{2}\right] + N_{l+1} \cdot \frac{\varkappa-l}{2}, & \text{если } \varkappa > l \text{ и } \varkappa - l \in 2\mathbb{Z}; \\ \left[\frac{l+1-\min(l, N_{l+1})}{2}\right] + N_{l+1} \cdot \frac{\varkappa-l+1}{2}, & \text{если } \varkappa > l \text{ и } \varkappa - l \notin 2\mathbb{Z}. \end{cases}$$

Случай 0: $\varkappa \leq l$.

- Если $\varkappa - l$ четно, то $[(\varkappa+1)/2] \geq [(l+1)/2] + N_{l+1} \cdot (\varkappa - l)/2$ (так как $N_{l+1} \geq 1$).
- Если же $\varkappa - l$ нечетно, то $[(\varkappa+1)/2] \geq [l/2] + N_{l+1} \cdot (\varkappa - l + 1)/2 \geq [(l+1 - \min(l, N_{l+1}))/2] + N_{l+1} \cdot (\varkappa - l + 1)/2$.

В итоге мы получаем при всех \varkappa и l

$$\sum_D d_D \geq \begin{cases} \left[\frac{l+1}{2}\right] + N_{l+1} \cdot \frac{\varkappa-l}{2}, & \text{если } \varkappa - l \in 2\mathbb{Z}; \\ \left[\frac{l+1-\min(l, N_{l+1})}{2}\right] + N_{l+1} \cdot \frac{\varkappa-l+1}{2}, & \text{если } \varkappa - l \notin 2\mathbb{Z}. \end{cases}$$

Случай 1: $\varkappa - l$ чётно.

$$\sum_D d_D \geq \left[\frac{l+1}{2}\right] + N_{l+1} \cdot \frac{\varkappa-l}{2} \implies \varkappa - l \leq \frac{2}{N_{l+1}} \left(\sum_D d_D - \left[\frac{l+1}{2}\right] \right) \implies \varkappa - l \leq 2 \left[\frac{1}{N_{l+1}} \left(\sum_D d_D - \left[\frac{l+1}{2}\right] \right) \right],$$

где последняя импликация выполняется из-за того, что $\varkappa - l \in 2\mathbb{Z}$. Это и есть неравенство (3), так как $\varkappa = \chi(S) + \sum_D (d_D - 1)$.

Случай 2: $\varkappa - l$ нечетно.

$$\sum_D d_D \geq \left[\frac{l+1-N_{l+1}}{2}\right]_+ + N_{l+1} \cdot \frac{\varkappa-l+1}{2} \implies \varkappa - l + 1 \leq \frac{2}{N_{l+1}} \left(\sum_D d_D - \left[\frac{l+1-N_{l+1}}{2}\right]_+ \right);$$

чётность числа $\varkappa - l + 1$ теперь означает, что $\varkappa - l + 1 \leq 2 \left[\frac{1}{N_{l+1}} \left(\sum_D d_D - \left[\frac{l+1-N_{l+1}}{2}\right]_+ \right) \right]$, что и требовалось.
Это завершает доказательство.

5. Основная теорема

Основная теорема. Пусть в свободном произведении групп $G = \ast_{j \in J} A_j$ имеет место равенство

$$c_1 \dots c_k d_1 \dots d_l = u_1^{n_1} \dots u_m^{n_m}, \quad (4)$$

где c_i — коммутаторы, d_i сопряжены элементам из $\bigcup_{j \in J} A_j$, элементы u_i сопряжены между собой и не сопряжены элементам из $\bigcup_{j \in J} A_j$, и n_i — натуральные числа. Тогда выполнено неравенство

$$2 - 2k - l + \sum_{i=1}^m (n_i - 1) \leq \begin{cases} 2 \left[\frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^m n_i - \left[\frac{l+1}{2}\right] \right) \right], & \text{если число } \sum_{i=1}^m (n_i - 1) - l \text{ чётно;} \\ 2 \left[\frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^m n_i - \left[\frac{l+1-N}{2}\right]_+ \right) \right] - 1, & \text{если число } \sum_{i=1}^m (n_i - 1) - l \text{ нечётно,} \end{cases}$$

где $[x]_+ \stackrel{\text{опр}}{=} \max([x], 0)$, а N — минимальный порядок элемента из $\bigcup_{j \in J} A_j$, входящего в циклически несократимую запись элемента u , сопряженного всем u_i (в частности, при $N = \infty$ правая часть есть 0 или -1).

Доказательство. Без ограничения общности можно считать, что в свободном произведении $G = \ast_{j \in J} A_j$ всего два сомножителя. Действительно, пусть циклически несократимая форма u элементов u_i содержит какой-то

слог $a_j \in A_j \setminus \{1\}$ для некоторого $j \in J$. Тогда группа G раскладывается в свободное произведение $G = A * B$, где $A = A_j$ и $B = \underset{j' \in J \setminus \{j\}}{*} A_{j'}$, а условия теоремы остаются выполненными для этого разложения. Итак, мы считаем, что сомножителей два: $G = A * B$.

Равенство (4) позволяет нарисовать диаграмму Хауи на некоторой ориентированной замкнутой (не обязательно связной) поверхности S рода $k' \stackrel{\text{опр}}{=} \frac{1}{2}(2 - \chi(S))$ с l' внешними вершинами и m клетками, метки которых суть u^{n_1}, \dots, u^{n_m} , причём

$$k' \leq k \quad \text{и} \quad 2k' + l' \leq 2k + l.$$

Аккуратно это объяснено в [IK18]. Мы ограничимся только примерами. Если $k = m = 1$ и $l = 0$, то в большинстве случаев получится обычный тор без внешних вершин (с несколькими внутренними вершинами) и с одной клеткой, метка которой есть $u_1^{n_1}$ (смотрите рисунок 1, например); но если, например, коммутатор c_1 имеет вид $c_1 = [a, v]$, где $a \in A \setminus \{1\}$ и $v \in (A * B) \setminus A$, то получится сфера с двумя внешними вершинами (метки которых суть a и a^{-1}) и одной клеткой, метка которой есть c_1 . При $m > 1$ может даже получиться несвязная поверхность (если равенство (4) распадётся в произведение двух равенств такого же типа).

Определим на полученной диаграмме кратное равномерное движение естественным образом: клетку с меткой u^{n_i} обезжают n_i автомобилями со скоростью одно ребро в минуту, в момент времени $s \in \mathbb{Z}$ каждый автомобиль будет находиться в углу, метка которого равна s -й букве слова u (если s считать по модулю длины слова u).

Таким образом, столкновений вне вершин (то есть во внутренних точках рёбер) произойти не может, поскольку в каждый момент времени

- либо все автомобили находятся в A -вершинах,
- либо все автомобили находятся в B -вершинах,
- либо каждый автомобиль едет по ребру от A -вершины к B -вершине,
- либо каждый автомобиль едет по ребру от B -вершины к A -вершине.

Полное столкновение в некоторой вершине v означает, что все углы при этой вершине имеют одинаковую метку, равную некоторой букве слова u . Если эта вершина v внутренняя, то произведение этих меток должно быть единицей, то есть $\deg v \geq N$. Применив следствие леммы о кластерах к этому движению, мы получим неравенство

$$\Phi(k', l') \stackrel{\text{опр}}{=} 2 - 2k' - l' + \sum_{i=1}^m (n_i - 1) \leq \Psi(l') \stackrel{\text{опр}}{=} \begin{cases} 2 \left[\frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^m n_i - \left[\frac{l'+1}{2} \right] \right) \right], & \text{если } \sum_{i=1}^m (n_i - 1) - l' \in 2\mathbb{Z}; \\ 2 \left[\frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^m n_i - \left[\frac{l'+1-N}{2} \right]_+ \right) \right] - 1, & \text{если } \sum_{i=1}^m (n_i - 1) - l' \notin 2\mathbb{Z}. \end{cases} \quad (5)$$

Правая часть этой оценки удовлетворяет неравенствам

$$\Psi(l+2) \leq \Psi(l) \quad \text{и} \quad \Psi(l \pm 1) \leq \Psi(l) + 1 \quad \text{при всех } l. \quad (6)$$

Действительно, первое из этих неравенств очевидно, а для объяснения второго неравенства положим $n \stackrel{\text{опр}}{=} \sum n_i$. Тогда, если число $\sum(n_i - 1) - l$ чётно, то

$$\begin{aligned} \Psi(l \pm 1) &\leq \Psi(l-1) = 2 \left[\frac{1}{N} \left(n - \left[\frac{l-N}{2} \right]_+ \right) \right] - 1 \leq 2 \left[\frac{1}{N} \left(n - \left[\frac{l-N}{2} \right] \right) \right] - 1 \leq \\ &\leq 2 \left[\frac{1}{N} \left(n - \left[\frac{l+1-2N}{2} \right] \right) \right] - 1 = 2 \left[\frac{1}{N} \left(n - \left[\frac{l+1}{2} \right] + N \right) \right] - 1 = 2 \left[\frac{1}{N} \left(n - \left[\frac{l+1}{2} \right] \right) \right] + 2 - 1 = \Psi(l) + 1; \end{aligned}$$

если же число $\sum(n_i - 1) - l$ нечётно, то $\Psi(l \pm 1) \leq \Psi(l-1) = 2 \left[\frac{1}{N} \left(n - \left[\frac{l}{2} \right] \right) \right] \leq 2 \left[\frac{1}{N} \left(n - \left[\frac{l+1-N}{2} \right]_+ \right) \right] = \Psi(l) + 1$. Это доказывает оценку (6).

Теперь, если $l' \geq l$, то $\Phi(k', l') \leq \Phi(k', l')$, поскольку $2k' + l' \leq 2k + l$ (как было отмечено выше), а $\Psi(l') \stackrel{(6)}{\leq} \Psi(l) + 1$. Следовательно, $\Phi(k, l) \leq \Phi(k', l') \leq \Psi(l') \stackrel{(6)}{\leq} \Psi(l) + 1$ и, стало быть, $\Phi(k, l) \leq \Psi(l)$, поскольку числа $\Phi(k, l)$ и $\Psi(l)$ имеют, очевидно, одинаковую чётность. Это и требовалось доказать.

В случае же, когда $l' < l$, заметим, что из (6) вытекает монотонность функции $l \mapsto l + \Psi(l)$. Поэтому утверждение теоремы в этом случае немедленно вытекает из (5) и того, что $k' \leq k$.

СПИСОК ЦИТИРОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- [Кл05] Ант. А. Клячко, Гипотеза Кервера–Лауденбаха и копредставления простых групп, Алгебра и логика, 44:4 (2005), 399–437. См. также arXiv:math.GR/0409146.
- [Кл06а] Ант. А. Клячко, Как обобщить известные результаты об уравнениях над группами, Мат. заметки, 79:3 (2006), 409–419. См. также arXiv:math.GR/0406382.
- [Кл06в] Ант. А. Клячко, SQ-универсальность относительных копредставлений с одним соотношением Мат. сборник, 197:10 (2006), 87–108. См. также arXiv:math.GR/0603468.
- [Кл07] Ант. А. Клячко, Свободные подгруппы относительных копредставлений с одним соотношением, Алгебра и логика, 46:3 (2007), 290–298. См. также arXiv:math.GR/0510582.
- [Cal09] D. Calegari, scl. MSJ Memoirs, 20. Mathematical Society of Japan, Tokyo, 2009. xii+209 pp.
- [Ch18] L. Chen, Spectral gap of scl in free products, Proc. Amer. Math. Soc., 146:7 (2018), 3143–3151. См. также arXiv:1611.07936.
- [Cl03] A. Clifford, Non-amenable type K equations over groups, Glasgow Mathematical Journal 45:2 (2003), 389–400.
- [ClG95] A. Clifford and R. Z. Goldstein, Tesselations of S^2 and equations over torsion-free groups, Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society 38:3 (1995), 485–493.
- [ClG01] A. Clifford and R. Z. Goldstein, The group $\langle G, t \mid e \rangle$ when G is torsion free, Journal of Algebra 245:1 (2001), 297–309.
- [CoR01] M. M. Cohen and C. Rourke, The surjectivity problem for one-generator, one-relator extensions of torsion-free groups, Geometry & Topology 5:1 (2001), 127–142. См. также arXiv:math/0009101.
- [CCE91] J. A. Comerford, L. P. Comerford Jr. and C. C. Edmunds, Powers as products of commutators, Comm. Algebra, 19:2 (1991), 675–684.
- [CER94] L. P. Comerford Jr., C. C. Edmunds and G. Rosenberger, Commutators as powers in free products of groups, Proc. Amer. Math. Soc., 122:1 (1994), 47–52. См. также arXiv:math/9310205.
- [Cull81] M. Culler, Using surfaces to solve equations in free groups, Topology, 20:2 (1981), 133–145.
- [DH91] A. J. Duncan and J. Howie, The genus problem for one-relator products of locally indicable groups, Mathematische Zeitschrift, 208:1 (1991), 225–237.
- [FeR96] R. Fenn and C. Rourke, Klyachko’s methods and the solution of equations over torsion-free groups, L’Enseignement Mathématique 42 (1996), 49–74.
- [FoR05a] M. Forester and C. Rourke, Diagrams and the second homotopy group, Communications in Analysis and Geometry 13:4 (2005), 801–820. См. также arXiv:math/0306088.
- [FoR05b] M. Forester and C. Rourke, The adjunction problem over torsion-free groups, Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 102:36 (2005), 12670–12671. См. также arXiv:math/0412274.
- [FK12] E. V. Frenkel and Ant. A. Klyachko, Commutators cannot be proper powers in metric small-cancellation torsion-free groups, arXiv:1210.7908.
- [How83] J. Howie, The solution of length three equations over groups, Proc. Edinburgh Math. Soc., 26:1 (1983), 89–96.
- [How90] J. Howie, The quotient of a free product of groups by a single high-powered relator. II. Fourth powers, Proc. London Math. Soc., s3-61:1 (1990), 33–62.
- [IK00] S. V. Ivanov and Ant. A. Klyachko, Solving equations of length at most six over torsion-free groups, Journal of Group Theory 3:3 (2000), 329–337.
- [IK18] S. V. Ivanov and Ant. A. Klyachko, Quasiperiodic and mixed commutator factorizations in free products of groups, Bull. London Math. Soc., 50:5 (2018), 832–844. См. также arXiv:1702.01379.
- [K93] Ant. A. Klyachko, A funny property of a sphere and equations over groups, Comm. Algebra, 21:7 (1993), 2555–2575.
- [Kl97] Ant. A. Klyachko, Asphericity tests, Internat. J. Algebra Comp., 7:4 (1997), 415–431.
- [Kl09] Ant. A. Klyachko, The structure of one-relator relative presentations and their centres, Journal of Group Theory, 12:6 (2009), 923–947. См. также arXiv:math.GR/0701308.
- [KlL12] Ant. A. Klyachko and D. E. Lurye, Relative hyperbolicity and similar properties of one-generator one-relator relative presentations with powered unimodular relator, J. Pure Appl. Algebra, 216:3 (2012), 524–534. См. также arXiv:1010.4220.
- [Le09] Le Thi Giang, The relative hyperbolicity of one-relator relative presentations, Journal of Group Theory, 12:6 (2009), 949–959. См. также arXiv:0807.2487.
- [Me06] S. Mertens, The easiest hard problem: number partitioning, Computational Complexity and Statistical Physics, 125:2 (2006), 125–139. См. также arXiv:cond-mat/0310317.
- [Sch59] M. P. Schützenberger, Sur l’équation $a^{2+n} = b^{2+m}c^{2+p}$ dans un groupe libre, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math., 248 (1959), 2435–2436.