

"Введение в топологию", конспект лекции 8.

А.С.Мищенко

5 ноября 2012 г.

План

Гомотопии. $\pi(X, Y)$, функториальность.

Что такое категория. Примеры категорий, функтор, гомотопический функтор. Категория гомотопических типов.

Пунктированные пространства. Категория пунктированных пространств. Морфизмы пунктированных пространств.

Пары топологических пространств. Тройки, n -ады.

Ретракция. Ретракт, деформационная ретракция, деформационный ретракт. Стягиваемость. Окрестностный ретракт.

Пара Борсука. (Постников, стр.83; Клеточные пространства.стр.15)

Фундаментальная группа. $\pi_1(\mathbb{S}^1)$. Перемена отмеченной точки. Фундаментальная группа декартового произведения. Теорема ван Кампена.

Гомотопия.

Рассмотрим два топологических пространства X и Y и два непрерывных отображения

$$f_0, f_1 : X \longrightarrow Y.$$

Будем говорить, что отображения f_0, f_1 *гомотопны* и писать $f_0 \sim f_1$, если существует непрерывное отображение F декартового произведения $X \times I$ пространства X на единичный отрезок вещественных чисел $I = [0, 1]$,

$$F : X \times I \longrightarrow Y,$$

для которого выполнены тождества

$$F(x, 0) \equiv f_0(x), \quad F(x, 1) \equiv f_1(x), \quad x \in X.$$

Отображение F называется *гомотопией* между отображениями f_0 и f_1 , а промежуточные отображения $f_t(x) = F(x, t)$ называются *деформацией*, соединяющей отображения f_0 и f_1 .

Заметим, что единичный отрезок I в определении гомотопии можно заменить на произвольный отрезок вещественных чисел, поскольку все отрезки вещественных чисел вида $[a, b]$ гомеоморфны между собой, а в качестве гомеоморфизма между ними можно выбрать линейное отображение. На пример, гомеоморфизм

$$\varphi : [0, 1] \longrightarrow [a, b]$$

можно задать формулой

$$\varphi(t) = a + t(b - a), \quad t \in [0, 1].$$

Из этого замечания следует, что отношение гомотопности между отображениями является отношением эквивалентности, т.е. выполнены естественные свойства отношения эквивалентности:

- $f \sim f$;
- из $f \sim g$ следует $g \sim f$;
- если $f \sim g$ и $g \sim h$, то $f \sim h$.

Провести доказательное рассуждение!!

Определение 1 $\pi(X, Y)$

Теорема 1 Пусть заданы непрерывные отображения

$$f_0, f_1 : X \longrightarrow Y, \quad g_0, g_1 : Y \longrightarrow Z.$$

Если гомотопны отображения f_0 и f_1 , а также гомотопны отображения g_0 и g_1 , то соответствующие композиции $h_0 = g_0 \cdot f_0$ и $h_1 = g_1 \cdot f_1$ тоже гомотопны.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Провести доказательное рассуждение!!

Теорема 2 Функториальность:

$$\pi(X, Y) \times \pi(Y, Z) \longrightarrow \pi(X, Z)$$

Определение 2 Категория гомотопических типов

Теорема 3 Непрерывные отображения $f, g : X \longrightarrow Y \times Z$ гомотопны тогда и только тогда, когда обе проекции на множители, т.е. композиции $pr_X \cdot f, pr_X \cdot g$ и $pr_Y \cdot f, pr_Y \cdot g$, соответственно, гомотопны.

Теорема 4 Иначе: Диаграмма

$$\begin{array}{ccc} \pi(Z, X \times Y) & \xrightarrow{pr_X} & \pi(Z, X) \\ \downarrow pr_Y & \searrow \approx & \uparrow \\ \pi(Z, Y) & \longleftarrow & \pi(Z, X) \times \pi(Z, Y) \end{array}$$

коммутативна.

Таким образом, семейство всех непрерывных отображений $\{f : X \rightarrow Y\}$ разбивается на классы попарно гомотопных непрерывных отображений. Категория топологических пространств и непрерывных отображений \mathcal{TOP} тем самым редуцируется до категории \mathcal{HT} так называемых *гомотопических типов*: объектами служат топологические пространства, а морфизмами — классы попарно гомотопных непрерывных отображений.

По аналогии с понятием гомеоморфизма в категории \mathcal{TOP} топологических пространств, в категории \mathcal{HT} гомотопических типов вводится понятие *гомотопической эквивалентности* топологических пространств. Напомним (см. ??), что под гомеоморфизмом мы понимаем обратимое непрерывное отображение, т.е. такое взаимно однозначное непрерывное отображение $f : X \rightarrow Y$ пространства X на пространство Y , у которого обратное отображение $f^{-1} : Y \rightarrow X$ тоже непрерывно. Другими словами, к отображению f имеется другое отображение $g : Y \rightarrow X$, причем две возможные композиции f и g являются тождественными отображениями, т.е.

$$f \cdot g = \text{Id}_Y, \quad g \cdot f = \text{Id}_X.$$

Определение 3 Под *гомотопической эквивалентностью* между топологическими пространствами X и Y понимается такое непрерывное отображение $f : X \rightarrow Y$, для которого имеется другое непрерывное отображение $g : Y \rightarrow X$, такое что две возможные композиции f и g гомотопны тождественным отображениям, т.е.

$$f \cdot g \sim \text{Id}_Y, \quad g \cdot f \sim \text{Id}_X,$$

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & g \cdot f \sim \text{Id}_X & & f \cdot g \sim \text{Id}_Y & & \\
 X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g=f^{-1}} & X & \xrightarrow{f} & Y. \\
 & & & & & &
 \end{array}$$

В этом случае сами топологические пространства X и Y называются *гомотопически эквивалентными*

Примеры

Привести доказательства!!

1. Гомеоморфные топологические пространства гомотопически эквивалентны.
2. Эвклидово пространство \mathbf{R}^n гомотопически эквивалентно одноточечному пространству $\{x_0\}$ (которое можно отождествить с \mathbf{R}^0).
3. Замкнутый диск $D^n \subset \mathbf{R}^b$, $D^n = \{x \in \mathbf{R}^n : x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 \leq 1\}$ гомотопически эквивалентен одноточечному пространству.
4. Открытый диск $\overset{\circ}{D}^n \subset \mathbf{R}^b$, $\overset{\circ}{D}^n = \{x \in \mathbf{R}^n : x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 < 1\}$ гомотопически эквивалентен одноточечному пространству.

Стягиваемость пространства к своему подпространству

Определение 4 Ретракция, ретракт, деформационный ретракт, деформационная ретракция.

Теорема 5 Ретракция $X \xrightarrow{f} A \subset X$ это такое отображение $f : X \rightarrow X$, что $f \cdot f = f$. Здесь A — множество неподвижных точек отображения f .

Теорема 6 Примеры ретрактов, которые не являются деформационными ретрактами

Теорема 7 Примеры: Лист Мебиуса, цилиндр — деформационные ретракции на экватор

Теорема 8 Конструкция Бинга — дом с двумя комнатами, у которого стенки образуют стягиваемое пространство.

Теорема 9 Основание цилиндра отображения является его деформационным ретрактом.

1 Фундаментальная группа, накрытия, теорема Ван-Кампена.

Пары топологических пространств. Пунктированные пространства

Парой топологических пространств (X, A) называется топологическое пространство X и его замкнутое подпространство $A \subset X$. Отображением пар $f : (X, A) \rightarrow (Y, B)$ называется такое отображение $f : X \rightarrow Y$, для которого выполнено условие $f(A) \subset B$. Ограничение $f_0 = f|_A : A \rightarrow B$ формирует тогда коммутативную диаграмму

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\subset} & X \\ \downarrow f_0 & & \downarrow f \\ B & \xrightarrow{\subset} & Y \end{array} \quad (1)$$

Поэтому часто также пишут, что отображение пар это пара отображений (f, f_0) , для которой диаграмма (1) коммутативна.

Если в паре (X, A) подмножество A состоит из одной точки x_0 , то тогда пространство X называется *пунктированным* пространством или *пространством с отмеченной точкой* x_0 . При этом отображения пунктированных пространств должны переводит отмеченную точку в отмеченную точку. Такие отображения будем называть *пунктированными отображениями*.

Гомотопия пар

$$F : X \times I \longrightarrow Y$$

— это такая гомотопия, которая при каждом значении параметра $t \in I$ отображает подмножество A в B , т.е. F есть отображение пары $(X \times I, A \times I)$ в пару (Y, I) . В случае пунктированных пространств гомотопия при каждом значении параметра $t \in I$ переводит отмеченную точку $x_0 \in X$ в отмеченную точку $y_0 \in Y$.

Все выше сказанное позволяет определить категорию \mathcal{HT}_0 пунктированных гомотопических типов как категорию пунктированных топологических пространств, морфизмы которых являются классами попарно гомотопных пунктированных отображений.

Фундаментальная группа

Рассмотрим *замкнутый (ориентированный) пунктированный путь* в пунктированном пространстве как непрерывное отображение единичного отрезка I действительных чисел в пространство X ,

$$\gamma : [0, 1] \longrightarrow X,$$

которое начинается и кончается в отмеченной точке $x_0 \in X$, т.е.

$$\gamma(0) = \gamma(1) = x_0.$$

Другими словами, отображение γ является отображением пар

$$\gamma : ([0, 1], \{0, 1\}) \longrightarrow (X, x_0).$$

Как и в случае гомотопий отображений заметим, что замкнутый путь γ можно задавать при помощи непрерывного отображения произвольного отрезка $[a, b]$:

$$\gamma : ([a, b], \{a, b\}) \longrightarrow (X, x_0).$$

При том замкнутый путь как однопараметрическое семейство точек $\{\gamma(t)\}$, $t \in [a, b]$ будем считать не зависимым от как выбора ориентированного параметра $t \in [a, b]$, так и от выбора самого отрезка $[a, b]$. Другими словами два замкнутых пути

$$\gamma_1 : ([a_1, b_1], \{a_1, b_1\}) \longrightarrow (X, x_0), \quad \gamma_2 : ([a_2, b_2], \{a_2, b_2\}) \longrightarrow (X, x_0)$$

будем считать эквивалентными (т.е. не будем их различать), если один параметр можно заменить на другой, т.е. имеется гомеоморфизм, сохраняющий начала и, соответственно, концы отрезков

$$\varphi : [a_1, b_1] \longrightarrow [a_2, b_2], \quad \varphi(a_1) = a_2, \quad \varphi(b_1) = b_2,$$

для которого выполнено тождество

$$\gamma_2(t) = \gamma_1(\varphi(t)), \quad t \in [a_1, b_1].$$

Множество классов попарно гомотопных или эквивалентных замкнутых пунктированных путей в пунктированном пространстве (X, x_0) будет обозначаться через $\pi_1(X, x_0)$. Заметим, что эквивалентные пути, получающиеся друг из друга путем замены параметра на одном и том же отрезке $[a, b]$ очевидным образом гомотопны, поскольку любой гомеоморфизм $\varphi : [a, b] \rightarrow [a, b]$, сохраняющий начало и, соответственно, конец отрезка, гомотопен тождественному отображению.

Во множестве $\pi_1(X, x_0)$ классов гомотопных путей естественным образом задается операция $\gamma_1 * \gamma_2 \in \pi_1(X, x_0)$, $\gamma_1, \gamma_2 \in \pi_1(X, x_0)$,

$$* : \pi_1(X, x_0) \times \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(X, x_0),$$

называемая *операцией композиции или умножения*. Операция композиции задается следующим образом. Рассмотрим два класса замкнутых путей $\gamma_1, \gamma_2 \in \pi_1(X, x_0)$. Без ограничения общности будем считать, что у замкнутого пути γ_1 параметр пробегает отрезок $[a, b]$, а у замкнутого пути γ_2 параметр пробегает отрезок $[b, c]$. Рассмотрим отрезок $[a, c]$ равный объединению двух отрезков

$$[a, c] = [a, b] \cup [b, c]$$

с единственной общей точкой b . Зададим отображение

$$\gamma_3 : [a, c] \rightarrow X$$

формулой:

$$\varphi_3(t) = \begin{cases} \gamma_1(t), & t \in [a, b], \\ \gamma_2(t), & t \in [b, c] \end{cases}$$

Это определение корректно определяет непрерывное отображение γ_3 , поскольку в единственной общей точке b значения отображений γ_1 и γ_2 совпадают:

$$\gamma_1(b) = \gamma_2(b) = x_0.$$

Так построенное отображение будем обозначать через $\gamma_3 = \gamma_1 * \gamma_2$ и называть *композицией замкнутых путей* *композиция замкнутых путей*. Если параметр t представлять как время, а сам путь как движение точки в пространстве X , то композиция представляет собой последовательное прохождение точки по двум путям, сначала по первому пути, а потом по второму пути.

Теорема 10 *Определение композиции * замкнутых путей корректно переносится на их гомотопические классы, т.е. на множество $\pi_1(X, x_0)$. Другими словами, если путь γ_1 гомотопен пути γ'_1 , а путь γ_2 гомотопен пути γ'_2 , то композиции тоже гомотопны:*

$$\gamma_1 * \gamma_2 \sim \gamma'_1 * \gamma'_2.$$

Теорема 11 Множество $\pi_1(X, x_0)$, оснащенное операцией $*$ является группой.

Группа $\pi_1(X, x_0)$ (в предположении операции $*$) называется *фундаментальной группой* пунктированного пространства (X, x_0)

Теорема 12 Непрерывное отображение пунктированных пространств

$$f : (X, x_0) \longrightarrow (Y, y_0)$$

при помощи композиции отображений порождает гомоморфизм фундаментальных групп

$$f_* : \pi_1(X, x_0) \longrightarrow \pi_1(Y, y_0).$$

Теорема 13 Два гомотопных непрерывных отображения пунктированных пространств

$$f \sim g : (X, x_0) \longrightarrow (Y, y_0)$$

порождают один и тот же гомоморфизм фундаментальных групп

$$f_* = g_* : \pi_1(X, x_0) \longrightarrow \pi_1(Y, y_0).$$

Теорема 14 Для двух непрерывных отображений пунктированных пространств

$$f : (X, x_0) \longrightarrow (Y, y_0), \quad g : (Y, y_0) \longrightarrow (Z, z_0)$$

композиция непрерывных отображений переходит в композицию гомоморфизмов фундаментальных групп:

$$g_* \cdot f_* = (g \cdot f)_* : \pi_1(X, x_0) \longrightarrow \pi_1(Z, z_0)$$

Следствие 1 Если пунктированные пространства (X, x_0) и (Y, y_0) гомотопически эквивалентны, то их фундаментальные группы изоморфны

$$\pi_1(X, x_0) \approx \pi_1(Y, y_0).$$

Другое определение фундаментальной группы

Всякий замкнутый пунктированный путь

$$\gamma : ([0, 1], \{0, 1\}) \longrightarrow (X, x_0).$$

пунктированного пространства можно однозначно представить в виде композиции

$$\begin{array}{ccc} ([0, 1], \{0, 1\}) & \xrightarrow{\gamma} & (X, x_0), \\ & \searrow p & \nearrow \tilde{\gamma} \\ & (\mathbf{S}^1, s_0) & \end{array}$$

причем соответствие $\gamma \Rightarrow \tilde{\gamma}$ является взаимно однозначным между замкнутыми пунктированными путями и пунктированными отображениями окружности, согласованным с гомотопиями пунктированных пространств.

Теорема 15 *Отображение $f : (\mathbf{S}^1, s_0) \longrightarrow (X, x_0)$ реализует нейтральный элемент группы $\pi_1(X, x_0)$ тогда и только тогда, когда отображение f продолжается до непрерывного отображения двумерного диска (\mathbf{D}^2, s_0) , у которого окружность (\mathbf{S}^1, s_0) является границей.*

Теорема Ван-Кампена

Теорема 16 (Ван-Кампен) *Фундаментальная группа букета $(X \vee Y, x_0 \vee y_0)$ двух пунктированных локально линейно связных локально односвязных пространств (X, x_0) и (Y, y_0) изоморфна свободному произведению фундаментальных групп слагаемых:*

$$\pi_1(X \vee Y, x_0 \vee y_0) \approx \pi_1(X, x_0) * \pi_1(Y, y_0).$$

Доказательство. Имеются гомоморфизмы

$$i_* : \pi_1(X, x_0) \longrightarrow \pi_1(X \vee Y, x_0 \vee y_0),$$

$$j_* : \pi_1(Y, y_0) \longrightarrow \pi_1(X \vee Y, x_0 \vee y_0),$$

порождаемые вложениями

$$i : (X, x_0) \longrightarrow (X \vee Y, x_0 \vee y_0),$$

$$j : (Y, y_0) \longrightarrow (X \vee Y, x_0 \vee y_0),$$

Значит, существует гомоморфизм

$$i_* \vee j_* : \pi_1(X, x_0) * \pi_1(Y, y_0) \longrightarrow \pi_1(X \vee Y, x_0 \vee y_0).$$

Эпиморфизм: Пусть $f : ([0; 1], \{0, 1\}) \longrightarrow (X \vee Y, x_0 \vee y_0)$ отображение, реализующее некоторый элемент в группе $\pi_1(X \vee Y, x_0 \vee y_0)$. Покрываем пространство $X \vee Y$ тремя открытыми множествами: $U_l = X \setminus \{x_0\}$, $U_r = Y \setminus \{y_0\}$, и $U_0 \subset X \vee Y$ — связная и односвязная окрестность точки $x_0 \vee y_0$. Прообразы всех трех множеств $f^{-1}(U_l)$, $f^{-1}(U_r)$, $f^{-1}(U_0)$, распадаются в несвязные объединения интервалов (и двух полуинтервалов). Они покрывают весь отрезок $[0, 1]$. Значит, существует конечное семейство таких интервалов, скажем, $\mathfrak{L} = \{(\alpha_i^l, \beta_i^l)\}$, $\mathfrak{R} = \{(\alpha_i^r, \beta_i^r)\}$, $\mathfrak{D} = \{(\alpha_i^0, \beta_i^0)\}$.


Интервалы из $\mathfrak{L} \cup \mathfrak{R}$ можно пронумеровать слева направо таким образом, чтобы $\mathfrak{L} \cup \mathfrak{R} = \{(x_i, y_i)\}$, $y_i \leq x_{i+1}$. Без ограничения общности можно считать, что в случае, когда $y_i = x_{i+1}$ эта точка отображается в отмеченную точку. В случае же, когда $y_i < x_{i+1}$, отрезок $[y_i, x_{i+1}]$ отображается в окрестность U_0 .

Поскольку окрестность линейно связна и односвязна, то любая точка $z \in U_0$ соединяется с начальной точкой $x_0 \vee y_0$ кривой γ_z , единственной с точностью до гомотопии, неподвижной на концах. Тогда кривая f гомотопна кривой f' , которая распадается в композицию кривых

$$\begin{aligned} f' &= (f_{[x_1, y_1]} * \gamma_{f(y_1)}^{-1}) * (\gamma_{f(y_1)} * f_{[y_1, x_2]} * \gamma_{f(x_2)}^{-1}) * (\gamma_{f(x_2)} * f_{[x_2, y_2]} * \gamma_{f(y_2)}^{-1}) * \dots \\ &\dots * (\gamma_{f(y_k)} * f_{[y_k, x_{k+1}]} * \gamma_{f(x_{k+1})}^{-1}) * (\gamma_{f(x_{k+1})} * f_{[x_{k+1}, y_{k+1}]} * \gamma_{f(y_{k+1})}^{-1}) * \dots \\ &\dots * (\gamma_{f(y_{N-1})} * f_{[y_{N-1}, x_N]} * \gamma_{f(x_N)}^{-1}) * (\gamma_{f(x_N)} * f_{[x_N, y_N]}). \end{aligned}$$

Каждый из сомножителей задает либо элемент в группе $\pi_1(X, x_0)$, либо в группе $\pi_1(Y, y_0)$, либо нейтральный элемент, т.е. композиция представляет элемент в свободном произведении $\pi_1(X, x_0) * \pi_1(Y, y_0)$.

Мономорфизм: Если слово $a_1 b_1 a_2 b_2 \cdot a_n b_n$ дает нейтральный элемент, то существует отображение квадрата I^2 , как показано на картинке. Красным отмечен прообраз X , синим отмечен прообраз Y , а желтым — прообраз отмеченной точки. Дальше нужно применять теорему Жордана, которая была студентам доказана в курсе наглядной геометрии на первом курсе: Весь квадрат разбивается на конечное число овалов. Самый внутренний дает тривиальность, скажем, b_1 . и т.д.



Пара Борсука и прочее

Теорема 17 *If $(X; A)$ is a CW pair consisting of a CW complex X and a contractible subcomplex A , then the quotient map $X \rightarrow X/A$ ([1]), p.11 is a homotopy equivalence.*

([1]), p.11

Список литературы

- [1] Allen Hatcher, *Algebraic Topology*, 2000.