О корректности задач аппроксимации и оптимизации для слабо выпуклых множеств и функций*

Г. Е. ИВАНОВ

Московский физико-технический институт
(государственный университет)
e-mail: g.e.ivanov@mail.ru

М. С. ЛОПУШАНСКИ

Московский физико-технический институт
(государственный университет)
e-mail: masha.alexandra@gmail.com

УДК 517.982.252

Ключевые слова: слабо выпуклые множества и функции, квазишар, метрическая проекция, инфимальная конволюция.

Аннотация

Рассматривается класс слабо выпуклых множеств относительно квазишара в банаховом пространстве, обобщающий классы множеств положительной достижимости, проксимально гладких множеств и прокс-регулярных множеств. Доказана корректность задачи о ближайших точках двух множеств, одно из которых слабо выпукло относительно квазишара M , а другое является слагаемым квазишара $-rM$ при $r \in (0, 1)$. Доказано, что если квазишар B является слагаемым квазишара M , то множество, слабо выпуклое относительно квазишара M , является слабо выпуклым и относительно квазишара B . Рассматривается класс слабо выпуклых функций относительно заданной выпуклой непрерывной функции γ , состоящий из функций, надграфика которых являются слабо выпуклыми множествами относительно надграфика функции γ . Получены достаточные условия корректности задачи инфимальной конволюции, а также достаточные условия того, что точка минимума этой задачи существует, единственна и непрерывно зависит от параметров.

Abstract

G. E. Ivanov, M. S. Lopushanski, Well-posedness of approximation and optimization problems for weakly convex sets and functions, Fundamentalnaya i prikladnaya matematika, vol. 18 (2013), no. 5, pp. 89–118.

We consider the class of weakly convex sets with respect to a quasiball in a Banach space. This class generalizes the classes of sets with positive reach, proximal smooth sets and prox-regular sets. We prove the well-posedness of the closest points problem of two sets, one of which is weakly convex with respect to a quasiball M , and the other one is a summand of the quasiball $-rM$, where $r \in (0, 1)$. We show that if a quasiball B is a summand of a quasiball M , then a set that is weakly convex with respect to the

*Работа поддержана РФФИ, проект 13-01-00295-а.

quasiball M is also weakly convex with respect to the quasiball B . We consider the class of weakly convex functions with respect to a given convex continuous function γ that consists of functions whose epigraphs are weakly convex sets with respect to the epigraph of γ . We obtain a sufficient condition for the well-posedness of the infimal convolution problem, and also a sufficient condition for the existence, uniqueness, and continuous dependence on parameters of the minimizer.

1. Обозначения

Пусть E — вещественное линейное нормированное пространство. Через $\text{int } A$, ∂A и $\bar{A}$ будем обозначать соответственно внутренность, границу и замыкание множества $A \subset E$. Значение функционала $p \in E^*$ на векторе $x \in E$ будем обозначать $\langle p, x \rangle$. Шаром радиуса $r \geq 0$ с центром в точке a называется множество

$$\mathfrak{B}_r(a) = \{x \in E: \|x - a\| \leq r\}.$$

Квазишаром M в банаховом пространстве E называется выпуклое замкнутое множество $M \subset E$, для которого $0 \in \text{int } M$.

Замечание 1.1. Квазишар M является шаром относительно некоторой нормы, эквивалентной исходной норме пространства E , тогда и только тогда, когда он ограничен относительно исходной нормы E и симметричен, т. е. $-M = M$.

Функцией Минковского квазишара M называется функция

$$\mu_M: E \rightarrow [0; +\infty),$$

такая что

$$\mu_M(x) = \inf\{t > 0 \mid x \in tM\} \text{ для любого } x \in E.$$

Функция $\mu: E \rightarrow \mathbb{R}$ называется *сублинейной*, если она *положительно однородна*, т. е.

$$\mu(\lambda x) = \lambda \mu(x) \text{ для всех } x \in E \text{ и } \lambda \geq 0,$$

и *субаддитивна*, т. е.

$$\mu(x + y) \leq \mu(x) + \mu(y) \text{ для любых } x, y \in E.$$

Сублинейная неотрицательная функция называется *несимметричной полунормой*.

Замечание 1.2. Непрерывная функция $\mu: E \rightarrow [0; +\infty)$ является несимметричной полунормой тогда и только тогда, когда она является функцией Минковского некоторого квазишара.

Пусть $M \subset E$ — квазишар. M -расстоянием от множества $C \subset E$ до множества $A \subset E$ называется величина

$$\varrho_M(C, A) = \inf_{c \in C, a \in A} \mu_M(c - a).$$

В частности, M -расстояние от точки $x \in E$ до множества $A \subset E$ определяется формулой

$$\varrho_M(x, A) = \inf_{a \in A} \mu_M(x - a).$$

Если $M = \mathfrak{B}_1(0)$, то $\varrho_M(C, A)$ совпадает с обычным (кратчайшим) расстоянием между множествами A и C , а $\varrho_M(x, A)$ — с обычным расстоянием от точки x до множества A :

$$\varrho_{\mathfrak{B}_1(0)}(C, A) = \varrho(C, A) = \inf_{a \in A, c \in C} \|a - c\|, \quad \varrho_{\mathfrak{B}_1(0)}(x, A) = \varrho(x, A) = \inf_{a \in A} \|x - a\|.$$

Замечание 1.3. Функция Минковского квазишара M удовлетворяет условию Липшица с константой $1/\varrho(0, \partial M)$.

Замечание 1.4. Из замечания 1.3 следует, что для любого множества $A \subset E$ функция $\varrho_M(\cdot, A)$ удовлетворяет условию Липшица с константой $1/\varrho(0, \partial M)$.

Замечание 1.5. Так как для любого квазишара $M \subset E$ и любого вектора $x \in E$ справедливо равенство $\mu_{-M}(x) = \mu_M(-x)$, то для любых множеств $A, C \subset E$ имеем $\varrho_M(C, A) = \varrho_{-M}(A, C)$.

Суммой Минковского множеств $A \subset E$ и $B \subset E$ называется множество

$$A + B = \{a + b \mid a \in A, b \in B\}.$$

Замечание 1.6. Непосредственно из определений следует, что

$$\varrho_M(C, A) = \inf\{t > 0 \mid (A + tM) \cap C \neq \emptyset\}.$$

Пусть $M \subset E$ — квазишар. Множеством *наилучших* относительно несимметричной полунормы $\mu_M(\cdot)$ *приближений* точки $x \in E$ элементами множества $A \subset E$ или, что то же самое, *M-проекцией* точки x на множество A называется множество

$$P_M(x, A) = A \cap (x - \varrho_M(x, A)M).$$

Для произвольных множеств $A, C \subset E$ и числа $\varepsilon \geq 0$ определим

$$P_M^\varepsilon(C, A) = A \cap (-(\varrho_M(C, A) + \varepsilon)M + C). \quad (1.1)$$

В частности, множество

$$P_M^\varepsilon(x, A) = A \cap (x - (\varrho_M(x, A) + \varepsilon)M)$$

называется ε -*проекцией* точки $x \in E$ на множество $A \subset E$ относительно квазишара M ; ε -проекция точки x также называется *почти наилучшим приближением* x .

Замечание 1.7. Если $\varrho_M(x, A) + \varepsilon > 0$, то

$$P_M^\varepsilon(x, A) = \{a \in A \mid \mu_M(x - a) \leq \varrho_M(x, A) + \varepsilon\}.$$

Обратным модулем выпуклости множества $M \subset E$ называется функция

$$\beta_M(t) = \sup \left\{ \|a - b\| \mid a, b \in M, \varrho \left(\frac{a+b}{2}, \partial M \right) < t \right\}, \quad t \geq 0. \quad (1.2)$$

В случае $M = \mathfrak{B}_1(0)$ функция $\beta_M(\cdot)$ является обратной к модулю выпуклости пространства E , введённому Дж. Кларксоном [12].

Множество $M \subset E$ называется *равномерно выпуклым*, если оно выпукло и $\lim_{t \rightarrow +0} \beta_M(t) = 0$.

Используя определение предела и равенство (1.2), получаем, что множество $M \subset E$ равномерно выпукло тогда и только тогда, когда оно выпукло и для любого числа $\varepsilon > 0$ существует число $\delta > 0$, такое что для любых точек $a, b \in M$ из неравенства $\varrho((a+b)/2, \partial M) < \delta$ следует неравенство $\|a - b\| < \varepsilon$.

Предложение 1.1 [6, 8]. Если множество M в банаховом пространстве равномерно выпуклое, то оно ограниченное.

Аналогом обратного модуля выпуклости для неограниченного множества является величина

$$\beta_M(t, R) = \sup \left\{ \|a - b\| \mid a, b \in M \cap \mathfrak{B}_R(0), \varrho\left(\frac{a+b}{2}, \partial M\right) < t \right\}, \quad t \geq 0. \quad (1.3)$$

Отметим, что $\beta_M(t, R)$ возрастает по t .

Множество $M \subset E$ называется *ограниченно равномерно выпуклым*, если оно выпукло и $\lim_{t \rightarrow +0} \beta_M(t, R) = 0$ для любого $R > 0$.

Множество $M \subset E$ называется *параболическим*, если для любого вектора $b \in E$ множество $(b + (1/2)M) \setminus M$ ограничено.

Из [18, лемма 5.1] вытекает следующий результат.

Предложение 1.1. Пусть множество $M \subset E$ выпуклое и параболическое, $0 < \lambda_1 < \lambda_2$, $x_1, x_2 \in E$. Тогда множество $(\lambda_1 M + x_1) \setminus (\lambda_2 \text{int } M + x_2)$ ограниченное.

Пусть задана функция $f: E \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$. Рассмотрим задачу

$$\min_{x \in E} f(x). \quad (1.4)$$

Последовательность $\{x_k\} \subset X$ называется *минимизирующей*, если

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) = \inf_{x \in E} f(x).$$

Определение 1.1. Задача (1.4) называется *корректной*, если любая минимизирующая последовательность сходится к точке минимума этой задачи.

Замечание 1.8. Если задача (1.4) корректна, то точка минимума этой задачи единственна.

2. Слабо выпуклые множества

Г. Федерер [14] ввёл понятие *множества положительной достижимости*, т. е. такого множества $A \subset \mathbb{R}^n$, что $\text{reach}(A) > 0$, где

$$\text{reach}(A) = \sup \{r > 0 \mid \text{для всех } x \in E, \text{ таких что } 0 < \varrho(x, A) < r, \\ P(x, A) \text{ состоит из одного элемента}\}.$$

Такие множества также называются *множествами с чебышёвским слоем* [1].

В [11] было введено понятие *проксимально гладкого множества* как обобщение понятия множества положительной достижимости на гильбертово пространство. В [9, 10] исследовались *равномерно r -прокс-регулярные множества* в банаховом пространстве E , т. е. такие множества $A \subset E$, что

$$P(a + rz, A) = \{a\} \text{ для всех } a \in A \text{ и всех } z \in N(a, A), \text{ таких что } \|z\| < 1,$$

где

$$N(a, A) = \{z \in E \mid \text{найдётся } t > 0, \text{ такое что } a \in P(a + tz, A)\} -$$

конус проксимальных нормалей ко множеству A в точке a . В [22] было показано, что в гильбертовом пространстве класс проксимально гладких множеств совпадает с классом равномерно прокс-регулярных множеств. В [2] рассматривались свойства проксимально гладких множеств в банаховом пространстве и была установлена взаимосвязь этого класса и других близких классов множеств.

Множеством единичных *проксимальных нормалей* ко множеству $A \subset E$ в точке $a \in A$ относительно квазишара $M \subset E$ называется множество

$$N_M^1(a, A) = \{z \in \partial M \mid \text{найдётся } t > 0, \text{ такое что } a \in P_M(a + tz, A)\}. \quad (2.1)$$

Заметим, что если для точки $a \in A$ множество $N_M^1(a, A)$ не пусто, то $a \in \partial A$; обратное, вообще говоря, неверно.

Множество $A \subset E$ называется *слабо выпуклым относительно квазишара* $M \subset E$, если

$$a \in P_M(a + z, A) \text{ для всех } a \in A \text{ и } z \in N_M^1(a, A).$$

Замечание 2.1. Для любых векторов $z \in \partial M$, $a \in A$ включение $a \in P_M(a + z, A)$, неравенство $\varrho_M(a + z, A) \geq 1$, равенство $\varrho_M(a + z, A) = 1$ и соотношение $(a + z - \text{int } M) \cap A = \emptyset$ эквивалентны (рис. 1).

Рис. 1

Замечание 2.2. Любое выпуклое множество в нормированном пространстве E является слабо выпуклым относительно любого квазишара в E .

В случае $M = \mathfrak{B}_r(0)$, $r > 0$, класс множеств, слабо выпуклых относительно M , совпадает с классом равномерно r -прокс-регулярных множеств.

В [13, 16, 17] рассматривался класс слабо выпуклых множеств относительно ограниченного, но не симметричного квазишара.

Из [19, теорема 2.5] вытекает следующее утверждение.

Предложение 2.1. Пусть в банаховом пространстве E квазишар M параболический и ограниченно равномерно выпуклый, множество $A \subset E$ замкнутое. Тогда следующие условия эквивалентны:

- 1) множество A слабо выпуклое относительно M ;
- 2) для любой точки $x_0 \in E$, такой что $0 < \varrho_M(x_0, A) < 1$, задача

$$\min_{a \in A} \mu_M(x_0 - a)$$

корректна;

- 3) отображение $x \mapsto F_M(x, A)$ однозначно и непрерывно на множестве $\{x \in E \mid 0 < \varrho_M(x, A) < 1\}$.

Предложение 2.1 [19, лемма 5.4]. Пусть в банаховом пространстве E квазишар M параболический и ограниченно равномерно выпуклый, множество $A \subset E$ замкнутое и слабо выпуклое относительно M . Пусть существует точка $x_0 \in E$, такая что $\varrho_M(x_0, A) > 0$. Тогда $A + \text{int } M \neq E$.

Лемма 2.1. Пусть строго выпуклый квазишар $M \subset E$, векторы $x, y \in E$ и число $R > 0$ удовлетворяют неравенствам

$$0 < \|x\| \leq R \cdot \mu_M(x), \quad 0 < \|y\| \leq R \cdot \mu_M(y).$$

Тогда

$$\left\| \frac{x}{\mu_M(x)} - \frac{y}{\mu_M(y)} \right\| \leq \beta_M \left(\frac{R \cdot (\mu_M(x) + \mu_M(y) - \mu_M(x+y))}{\min\{\mu_M(x), \mu_M(y)\}}, R \right),$$

где функция $\beta_M(\cdot, \cdot)$ определена формулой (1.3).

Доказательство. Обозначим

$$a = \frac{x}{\mu_M(x)}, \quad b = \frac{y}{\mu_M(y)}, \quad c = \frac{a+b}{2}, \quad \mu_1 = \mu_M(x), \quad \mu_2 = \mu_M(y),$$

$$t = \frac{R \cdot (\mu_M(x) + \mu_M(y) - \mu_M(x+y))}{\min\{\mu_M(x), \mu_M(y)\}}.$$

Без потери общности будем считать, что $\mu_2 \leq \mu_1$. Используя сублинейность функции μ_M и учитывая, что $\mu_M(a) = 1$, имеем

$$\begin{aligned} \mu_M(x+y) &= \mu_M((\mu_1 - \mu_2)a + \mu_2(a+b)) \leq \\ &\leq (\mu_1 - \mu_2) \cdot \mu_M(a) + \mu_2 \cdot \mu_M(a+b) = \mu_1 + \mu_2 - 2\mu_2 \cdot (1 - \mu_M(c)). \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\mu_M(c) \geq 1 - \frac{t}{2R}. \quad (2.2)$$

Покажем, что

$$\varrho(c, \partial M) < t. \quad (2.3)$$

Если $t > R$, то, используя включения $a, b \in \partial M \cap \mathfrak{B}_R(0)$, имеем

$$\varrho(c, \partial M) \leq \|c - a\| = \frac{\|a - b\|}{2} \leq R < t.$$

Поэтому в данном случае неравенство (2.3) справедливо.

Пусть теперь $t \leq R$. Тогда из неравенства (2.2) следует, что

$$\mu_M(c) \geq \frac{1}{1 + t/R},$$

а значит,

$$\left(1 + \frac{t}{R}\right)c \notin \text{int } M.$$

Поэтому

$$\varrho(c, \partial M) \leq \left\| \left(1 + \frac{t}{R}\right)c - c \right\| = \frac{\|c\|t}{R} < t.$$

Таким образом, неравенство (2.3) доказано.

Из неравенства (2.3) и включений $a, b \in M \cap \mathfrak{B}_R(0)$ согласно равенству (1.3) получаем неравенство $\|a - b\| \leq \beta_M(t, R)$. $\square$

Лемма 2.2. Пусть множество $A \subset E$ слабо выпукло относительно строго выпуклого квазишара $M \subset E$, точка $x_0 \in E$ и число $\varepsilon > 0$ таковы, что $0 < \varrho_M(x_0, A) = \varrho < 1 - \varepsilon$. Пусть $a_0 \in P_M(x_0, A)$, $a \in P_M^\varepsilon(x_0, A)$ и

$$R = \max \left\{ \frac{\|x_0 - a_0\|}{\mu_M(x_0 - a_0)}, \frac{\|x_0 - a\|}{\mu_M(x_0 - a)} \right\}.$$

Тогда

$$\|a - a_0\| \leq \varepsilon R + \varrho \beta_M \left(\frac{\varepsilon R}{\min\{\varrho, 1 - \varrho\}}, R \right).$$

Доказательство. Обозначим

$$z = \frac{x_0 - a_0}{\varrho}, \quad x = x_0 - a, \quad y = (1 - \varrho)z.$$

Так как множество A слабо выпукло относительно квазишара M и $z \in N_M^1(a_0, A)$, то $\varrho_M(a_0 + z, A) = 1$. Таким образом,

$$\varrho \leq \mu_M(x) \leq \varrho + \varepsilon,$$

$$\mu_M(x + y) = \mu_M(a_0 + z - a) \geq \varrho_M(a_0 + z, A) = 1 \geq \mu_M(x) + \mu_M(y) - \varepsilon.$$

Поэтому согласно лемме 2.1 имеем

$$\left\| \frac{x}{\mu_M(x)} - \frac{y}{\mu_M(y)} \right\| \leq \beta_M \left(\frac{\varepsilon R}{\min\{\varrho, 1 - \varrho\}}, R \right).$$

Используя соотношения

$$\left\| \frac{x}{\mu_M(x)} - \frac{x}{\varrho} \right\| = \frac{\|x\|}{\mu_M(x)} \frac{|\mu_M(x) - \varrho|}{\varrho} \leq \frac{\varepsilon R}{\varrho}, \quad \left\| \frac{y}{\mu_M(y)} - \frac{x}{\varrho} \right\| = \frac{\|a - a_0\|}{\varrho},$$

получаем доказываемое неравенство. $\square$

3. Слагаемые квазишара

Множество $C \subset E$ называется *слагаемым квазишара* $M \subset E$, если C выпукло, замкнуто и существует множество $C_1 \subset E$, такое что $C + C_1 = M$.

Лемма 3.1. Пусть множество $C \subset E$ является слагаемым строго выпуклого квазишара $M \subset E$. Тогда

$$C - c_0 \subset M - z \text{ для всех } c_0 \in C \text{ и } z \in N_M^1(c_0, C).$$

Доказательство. Пусть $c_0 \in C$, $z \in N_M^1(c_0, C)$. В силу (2.1) существует число $t > 0$, такое что $c_0 \in P_M(c_0 + tz, C)$. Следовательно, $\varrho_M(c_0 + tz, C) = t$, а значит, $C \cap (c_0 + tz - t \operatorname{int} M) = \emptyset$. Согласно теореме об отделимости найдётся функционал $p \in E^* \setminus \{0\}$, такой что

$$\langle p, c \rangle \leq \langle p, c_0 + tz - tx \rangle \text{ для всех } c \in C \text{ и } x \in M.$$

Следовательно,

$$\langle p, z \rangle = \sup_{x \in M} \langle p, x \rangle, \quad \langle p, c_0 \rangle = \sup_{c \in C} \langle p, c \rangle.$$

По условию леммы существует множество $C_1 \subset E$, такое что $C + C_1 = M$. Так как $z \in N_M^1(c_0, C) \subset M = C + C_1$, то найдутся точки $c'_0 \in C$ и $c_1 \in C_1$, такие что $z = c'_0 + c_1$. Поскольку $c_0 + c_1 \in C + C_1 = M$ и

$$\langle p, c_0 + c_1 \rangle = \sup_{c \in C} \langle p, c \rangle + \langle p, c_1 \rangle \geq \langle p, c'_0 + c_1 \rangle = \langle p, z \rangle = \sup_{x \in M} \langle p, x \rangle,$$

то в силу строгой выпуклости множества M имеем $c_0 + c_1 = z$, т. е. $c_0 = c'_0$. Следовательно, $z - c_0 = c_1 \in C_1$. Таким образом, $z - c_0 + C \subset C_1 + C = M$, а значит, $C - c_0 \subset M - z$. $\square$

Лемма 3.2. Пусть в банаховом пространстве E квазишар M параболический и ограниченно равномерно выпуклый, множество $A \subset E$ замкнутое и слабо выпуклое относительно M . Пусть $r \in (0, 1)$ и множество $C \subset E$ является слагаемым квазишара $-rM$, $1 - r > \varepsilon > 0$, $0 < \varrho_M(C, A) < 1 - r - \varepsilon$. Тогда множества $P_M^\varepsilon(C, A)$ и $P_{-M}^\varepsilon(A, C)$ (см. (1.1)) ограниченные.

Доказательство. По предложению 2.1 найдётся точка $x_1 \in E \setminus (A + \operatorname{int} M)$. Поскольку множество C является слагаемым квазишара $-rM$, то существует множество $C_1 \subset E$, такое что $C + C_1 = -rM$. Зафиксируем произвольную точку $c_1 \in C_1$. Тогда $C + c_1 \subset -rM$. Обозначим $\varrho_0 = \varrho_M(C, A)$. Используя равенство (1.1) и соотношения $x_1 \in E \setminus (A + \operatorname{int} M)$, $C + c_1 \subset -rM$, получаем включения

$$\begin{aligned} P_M^\varepsilon(C, A) &\subset (-c_1 - (\varrho_0 + r + \varepsilon)M) \setminus (x_1 - \operatorname{int} M), \\ P_{-M}^\varepsilon(A, C) &\subset (-c_1 - rM) \setminus (x_1 - (1 - \varrho_0 - \varepsilon) \operatorname{int} M). \end{aligned}$$

Применяя предложение 1.1, получаем доказываемое утверждение. $\square$

Лемма 3.3. Пусть множество C является слагаемым ограниченного квазишара $M \subset E$. Тогда существует множество $X \subset E$, такое что $C = \bigcap_{x \in X} (M - x)$.

Доказательство. По условию множество C выпукло, замкнуто и существует множество X , такое что $C + X = M$. Обозначим $C' = \bigcap_{x \in X} (M - x)$. Требуется доказать равенство $C' = C$. Пусть $c \in C$, $x \in X$. Тогда $c + x \in C + X = M$, а значит, $c \in M - x$ для любого $x \in X$. Следовательно, $c \in C'$, и включение $C \subset C'$ доказано. Докажем обратное включение. Предположим противное: найдётся точка $c_0 \in C' \setminus C$. По теореме об отделимости найдётся функционал $p \in E^*$, такой что

$$\langle p, c_0 \rangle > \sup_{c \in C} \langle p, c \rangle. \quad (3.1)$$

Поскольку $c_0 \in C'$, то $c_0 + X \subset M = C + X$. Следовательно,

$$\langle p, c_0 \rangle + \sup_{x \in X} \langle p, x \rangle \leq \sup_{c \in C} \langle p, c \rangle + \sup_{x \in X} \langle p, x \rangle. \quad (3.2)$$

В силу ограниченности квазишара M и включения $c_0 + X \subset M$ имеем $\sup_{x \in X} \langle p, x \rangle < +\infty$. Поэтому неравенство (3.2) противоречит неравенству (3.1). $\square$

Замечание 3.1. В общем случае множество вида $C = \bigcap_{x \in X} (M - x)$ может не быть слагаемым квазишара M . Если любое множество C такого вида является слагаемым выпуклого замкнутого множества M , то множество M называется порождающим [7]. Известно, что любое выпуклое замкнутое множество в двумерном пространстве является порождающим. Шар в гильбертовом пространстве также является порождающим. Шар в пространстве $L_p[a, b]$ при $p \in [1, 2) \cup (2, +\infty)$ порождающим не является. В [4] получен критерий того, что гладкое выпуклое множество является порождающим.

Лемма 3.4. Если множество C является слагаемым равномерно выпуклого квазишара M в банаховом пространстве E , то обратные модули выпуклости множеств C и M связаны неравенством

$$\beta_C(t) \leq \beta_M(t) \text{ для любого } t > 0.$$

Доказательство. Согласно предложению 1.1 квазишар M ограниченный. Отсюда и из леммы 3.3 следует существование множества $X \subset E$, такого что $C = \bigcap_{x \in X} (M - x)$. Предположим, что доказываемое утверждение неверно, т. е. существует число $t > 0$, такое что $\beta_C(t) > \beta_M(t)$. Тогда в силу равенства (1.2) существуют точки $a, b \in C$, такие что $\varrho((a + b)/2, \partial C) < t$ и $\|a - b\| > \beta_M(t)$. В силу неравенства $\varrho((a + b)/2, \partial C) < t$ найдётся точка $z \in E \setminus C$, такая что $\|(a + b)/2 - z\| < t$. Поскольку $z \notin C = \bigcap_{x \in X} (M - x)$, то существует точка $x \in X$, такая что $z \notin M - x$. Обозначим $a' = a + x$, $b' = b + x$. Тогда $a', b' \in M$,

$$\varrho\left(\frac{a' + b'}{2}, \partial M\right) \leq \left\| \frac{a' + b'}{2} - (z + x) \right\| = \left\| \frac{a + b}{2} - z \right\| < t.$$

Согласно равенству (1.2) имеем $\beta_M(t) \geq \|a' - b'\| = \|a - b\|$. Это противоречит неравенству $\|a - b\| > \beta_M(t)$. $\square$

4. Корректность задачи о ближайших точках двух множеств

Пусть заданы квазишар $M \subset E$ и множества $A, C \subset E$. Рассмотрим задачу

$$\min_{a \in A, c \in C} \mu_M(c - a). \quad (4.1)$$

В соответствии с определением 1.1 задача (4.1) корректна, если любые две последовательности $\{a_k\} \subset A$ и $\{c_k\} \subset C$, такие что $\lim_{k \rightarrow \infty} \mu_M(c_k - a_k) = \varrho_M(C, A)$, сходятся к некоторым точкам $\hat{a} \in A$ и $\hat{c} \in C$ соответственно. При этом в силу непрерывности функции Минковского имеем $\mu_M(\hat{c} - \hat{a}) = \varrho_M(C, A)$, т. е. пара точек $(\hat{a}, \hat{c})$ является решением задачи (4.1).

Замечание 4.1. Пусть E — банахово пространство, $M \subset E$ — квазишар, множества $A \subset E$ и $C \subset E$ замкнуты. Следующие условия эквивалентны:

- 1) $\lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \text{diam } P_M^\varepsilon(C, A) = 0$ и $\lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \text{diam } P_{-M}^\varepsilon(A, C) = 0$;
- 2) задача (4.1) корректна.

Теорема 4.1. Пусть в банаховом пространстве E квазишар M параболический и ограниченно равномерно выпуклый. Пусть множество $A \subset E$ замкнутое и слабо выпуклое относительно квазишара M . Пусть множество $C \subset E$ является слагаемым квазишара $-rM$, где $0 < r < 1$. Пусть $0 < \varrho_M(C, A) < 1 - r$. Тогда задача (4.1) корректна.

Доказательство. Обозначим

$$\varrho_0 = \varrho_M(C, A), \quad A_\varepsilon = P_M^\varepsilon(C, A), \quad C_\varepsilon = P_{-M}^\varepsilon(A, C).$$

Зафиксируем число $\varepsilon_0 \in (0, 1 - r - \varrho_0)$. По лемме 3.2 множества A_{ε_0} и C_{ε_0} ограниченные. Отсюда и из неравенств $\mu_M(c - a) \geq \varrho_0 > 0$, справедливых для любых $a \in A$, $c \in C$, получаем неравенство

$$R := \sup_{a \in A_{\varepsilon_0}, c \in C_{\varepsilon_0}} \frac{\|c - a\|}{\mu_M(c - a)} < +\infty. \quad (4.2)$$

Зафиксируем произвольные число $\varepsilon \in (0, \varepsilon_0]$ и точку $a_\varepsilon \in A_\varepsilon$. Поскольку множество C выпуклое, то оно слабо выпуклое относительно квазишара $-M$. Отсюда и из предложения 2.1 следует существование точки $c_\varepsilon \in P_{-M}(a_\varepsilon, C)$. Поскольку вектор $z_\varepsilon = (c_\varepsilon - a_\varepsilon) / \mu_M(c_\varepsilon - a_\varepsilon)$ удовлетворяет включению $z_\varepsilon \in -N_{-M}^1(c_\varepsilon, C)$, то по лемме 3.1

$$C - c_\varepsilon \subset r(z_\varepsilon - M). \quad (4.3)$$

Используя включение $a_\varepsilon \in A_\varepsilon$, имеем $\varrho_{-M}(a_\varepsilon, C) \leq \varrho_0 + \varepsilon$. Поэтому

$$\varrho_0 \leq \varrho_M(c_\varepsilon, A) \leq \mu_M(c_\varepsilon - a_\varepsilon) = \mu_{-M}(a_\varepsilon - c_\varepsilon) = \varrho_{-M}(a_\varepsilon, C) \leq \varrho_0 + \varepsilon < 1 - r. \quad (4.4)$$

Согласно предложению 2.1 существует точка

$$a'_\varepsilon \in P_M(c_\varepsilon, A). \quad (4.5)$$

Тогда вектор $z'_\varepsilon = (c_\varepsilon - a'_\varepsilon)/\mu_M(c_\varepsilon - a'_\varepsilon)$ удовлетворяет включению $z'_\varepsilon \in N_M^1(a'_\varepsilon, A)$. Так как множество A слабо выпуклое относительно квазишара M , то

$$a'_\varepsilon \in P_M(a'_\varepsilon + z'_\varepsilon, A). \quad (4.6)$$

Согласно соотношениям (4.4) имеем $a_\varepsilon \in P_M^\varepsilon(c_\varepsilon, A)$. Из равенства (4.2) и включений $a_\varepsilon \in A_\varepsilon$, $a'_\varepsilon \in A_\varepsilon$, $c_\varepsilon \in C_\varepsilon$ следуют неравенства

$$\|z_\varepsilon\| \leq R, \quad \|z'_\varepsilon\| \leq R. \quad (4.7)$$

Используя лемму 2.2 и соотношения (4.4), (4.5), получаем

$$\|a_\varepsilon - a'_\varepsilon\| \leq \Delta(\varepsilon) := \varepsilon R + \beta_M \left(\frac{\varepsilon R}{\min\{\varrho_0, r\}}, R \right). \quad (4.8)$$

Поскольку

$$\begin{aligned} z_\varepsilon - z'_\varepsilon &= \frac{c_\varepsilon - a_\varepsilon}{\mu_M(c_\varepsilon - a_\varepsilon)} - \frac{c_\varepsilon - a'_\varepsilon}{\mu_M(c_\varepsilon - a'_\varepsilon)} = \\ &= \frac{a'_\varepsilon - a_\varepsilon}{\mu_M(c_\varepsilon - a_\varepsilon)} + \left(\frac{1}{\mu_M(c_\varepsilon - a_\varepsilon)} - \frac{1}{\mu_M(c_\varepsilon - a'_\varepsilon)} \right) (c_\varepsilon - a'_\varepsilon), \end{aligned}$$

то

$$\|z_\varepsilon - z'_\varepsilon\| \leq \frac{\|a_\varepsilon - a'_\varepsilon\|}{\varrho_0} + R \frac{|\mu_M(c_\varepsilon - a'_\varepsilon) - \mu_M(c_\varepsilon - a_\varepsilon)|}{\varrho_0}.$$

По замечанию 1.3 функция $\mu_M(\cdot)$ удовлетворяет условию Липшица с некоторой константой L . Поэтому

$$\|z_\varepsilon - z'_\varepsilon\| \leq \frac{\|a_\varepsilon - a'_\varepsilon\|}{\varrho_0} (1 + RL). \quad (4.9)$$

Поскольку

$$\mu_M(c_\varepsilon - a'_\varepsilon) = \varrho_M(c_\varepsilon, A) \leq \mu_M(c_\varepsilon - a_\varepsilon) \leq \varrho_0 + \varepsilon < 1 - r$$

и

$$c_\varepsilon + rz'_\varepsilon - a'_\varepsilon = (\mu_M(c_\varepsilon - a'_\varepsilon) + r)z'_\varepsilon, \quad (4.10)$$

то $c_\varepsilon + rz'_\varepsilon \in [a'_\varepsilon, a'_\varepsilon + z'_\varepsilon]$. Отсюда и из включения (4.6) следует, что

$$a'_\varepsilon \in P_M(c_\varepsilon + rz'_\varepsilon, A). \quad (4.11)$$

Обозначим

$$\Delta_1(\varepsilon) = \varepsilon + \frac{rL(1 + RL)}{\varrho_0} \Delta(\varepsilon). \quad (4.12)$$

Покажем, что

$$A_\varepsilon \subset P_M^{\Delta_1(\varepsilon)}(c_\varepsilon + rz'_\varepsilon, A). \quad (4.13)$$

Действительно, пусть $a \in A_\varepsilon$. Используя включение (4.3), получаем, что

$$a \in C - (\varrho_0 + \varepsilon)M \subset c_\varepsilon + rz_\varepsilon - (r + \varrho_0 + \varepsilon)M,$$

т. е.

$$\mu_M(c_\varepsilon + rz_\varepsilon - a) \leq r + \varrho_0 + \varepsilon.$$

Поэтому согласно соотношениям (4.8), (4.9), (4.12) имеем

$$\begin{aligned} \mu_M(c_\varepsilon + rz'_\varepsilon - a) &\leq r + \varrho_0 + \varepsilon + r\mu_M(z'_\varepsilon - z_\varepsilon) \leq \\ &\leq r + \varrho_0 + \varepsilon + rL\|z'_\varepsilon - z_\varepsilon\| \leq r + \varrho_0 + \Delta_1(\varepsilon). \end{aligned} \quad (4.14)$$

Из соотношений (4.10), (4.11) следует, что

$$\varrho_M(c_\varepsilon + rz'_\varepsilon, A) = \mu_M(c_\varepsilon + rz'_\varepsilon - a'_\varepsilon) = \mu_M(c_\varepsilon - a'_\varepsilon) + r \geq \varrho_0 + r. \quad (4.15)$$

Комбинируя неравенства (4.14), (4.15), получаем неравенство

$$\mu_M(c_\varepsilon + rz'_\varepsilon - a) \leq \varrho_M(c_\varepsilon + rz'_\varepsilon, A) + \Delta_1(\varepsilon),$$

которое доказывает включение (4.13).

Из неравенств (4.7), (4.15), включений $a'_\varepsilon \in A_\varepsilon \subset A_{\varepsilon_0}$, $c_\varepsilon \in C_\varepsilon \subset C_{\varepsilon_0}$ и ограниченности множеств A_{ε_0} , C_{ε_0} следует, что

$$\sup_{\varepsilon \in (0, \varepsilon_0]} \sup_{a \in A_\varepsilon} \frac{\|c_\varepsilon + rz'_\varepsilon - a\|}{\mu_M(c_\varepsilon + rz'_\varepsilon - a)} < +\infty.$$

Отсюда согласно лемме 2.2 и соотношениям (4.11)–(4.15) получаем, что $\text{diam } A_\varepsilon \rightarrow 0$ при $\varepsilon \rightarrow +0$. Поскольку множества A_ε вложены друг в друга и замкнуты, то существует точка $\hat{a} \in \bigcap_{\varepsilon > 0} A_\varepsilon$. Покажем, что

$$C_\varepsilon \subset P_{-M}^{\varepsilon+L \text{diam } A_\varepsilon}(\hat{a}, C) \text{ для любого } \varepsilon \in (0, \varepsilon_0]. \quad (4.16)$$

Пусть $\varepsilon \in (0, \varepsilon_0]$, $c \in C_\varepsilon$. По предложению 2.1 существует точка $a \in P_M(c, A)$. Тогда

$$\varrho_{-M}(a, C) \leq \mu_{-M}(a - c) = \mu_M(c - a) = \varrho_M(c, A) \leq \varrho_0 + \varepsilon.$$

Следовательно, $a \in A_\varepsilon$ и

$$\mu_M(c - \hat{a}) \leq \mu_M(c - a) + \mu_M(a - \hat{a}) \leq \varrho_0 + \varepsilon + L \text{diam } A_\varepsilon \leq \varrho_{-M}(\hat{a}, C) + \varepsilon + L \text{diam } A_\varepsilon.$$

Отсюда следует включение (4.16). Согласно включению (4.16) и лемме 2.2 получаем, что $\text{diam } C_\varepsilon \rightarrow 0$ при $\varepsilon \rightarrow +0$. По замечанию 4.1 теорема доказана. $\square$

Результат, близкий к теореме 4.1, был получен в [5].

Пусть задан квазишар $M \subset E$. Множество $A \subset E$ называется *M-замкнутым*, если для любой точки $x \in E \setminus A$ справедливо неравенство $\varrho_M(x, A) > 0$.

Определение 4.1. Множество $A \subset E$ называется *M-квазиограниченным*, если оно является *M-замкнутым* и

$$\sup_{a \in \partial A \cap \mathfrak{B}_R(0)} \sup_{z \in N_M^1(a, A)} \|z\| < +\infty \text{ для любого } R > 0.$$

Замечание 4.2. Поскольку из *M-замкнутости* множества следует его замкнутость, то любое *M-квазиограниченное* множество является замкнутым.

Замечание 4.3. Если квазишар M ограничен, то любое замкнутое множество является *M-квазиограниченным*.

Лемма 4.1. Пусть в банаховом пространстве E квазишар M параболический и ограниченно равномерно выпуклый. Пусть множество $A \subset E$ является M -квазиограниченным и слабо выпуклым относительно M . Пусть множество $C \subset E$ является слагаемым квазишара $-rM$, где $r \in (0, 1)$. Пусть

$$\inf_{a \in A, c \in C} \|a - c\| > 0. \quad (4.17)$$

Тогда $\varrho_M(C, A) > 0$.

Доказательство. Если $\varrho_M(C, A) \geq 1 - r$, то требуемое неравенство доказано. Пусть $\varrho_M(C, A) < 1 - r$. По определению M -расстояния существует последовательность $\{c_n\} \subset C$, такая что $\varrho_M(c_n, A) \rightarrow \varrho_M(C, A)$ при $n \rightarrow \infty$. Поскольку $\varrho_M(C, A) < 1 - r$, то без ограничения общности считаем, что $\varrho_M(c_n, A) < 1 - r$ для любого $n \in \mathbb{N}$. Из неравенства (4.17) и M -замкнутости A следует, что $\varrho_M(c_n, A) > 0$. Тогда согласно предложению 2.1 для любого $n \in \mathbb{N}$ найдётся точка $a_n \in P_M(c_n, A)$. Из леммы 3.2 следует ограниченность последовательности $\{a_n\}$. Поэтому в силу M -квазиограниченности множества A найдётся число $R_1 > 0$, такое что $\|c_n - a_n\| \leq R_1 \cdot \mu_M(c_n - a_n)$. Следовательно, согласно неравенству (4.17) имеем

$$\varrho_M(C, A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_M(c_n - a_n) \geq \frac{1}{R_1} \inf_{a \in A, c \in C} \|a - c\| > 0. \quad \square$$

Теорема 4.2. Пусть в банаховом пространстве E квазишар M параболический и ограниченно равномерно выпуклый. Пусть множество $A \subset E$ является M -квазиограниченным и слабо выпуклым относительно M . Пусть множество $C \subset E$ является слагаемым квазишара $-rM$, где $r \in (0, 1)$ и $\text{int } C \neq \emptyset$. Пусть $\varrho_M(C, A) < 1 - r$, $A \cap \text{int } C = \emptyset$. Тогда задача (4.1) корректна.

Доказательство. Если $\varrho_M(C, A) > 0$, то достаточно применить теорему 4.1. Поэтому будем предполагать, что $\varrho_M(C, A) = 0$. Без ограничения общности считаем, что $0 \in \text{int } C$. Для любого $k \in \mathbb{N}$ рассмотрим множество

$$C_k = \left(1 - \frac{1}{k}\right) C. \quad (4.18)$$

Так как C — слагаемое квазишара $-rM$, то найдётся точка $c_1 \in E$, такая что $C + c_1 \subset -rM$. Используя включение $0 \in \text{int } M$, получаем, что существует число $r_1 > 0$, такое что $C \subset -r_1M$. Отсюда и из равенства $C_k + (1/k)C = C$ следует включение

$$C \subset -\frac{r_1}{k}M + C_k \quad \text{для любого } k \in \mathbb{N}. \quad (4.19)$$

Поскольку $\varrho_M(C, A) = 0$, то $(A + tM) \cap C \neq \emptyset$ для любого числа $t > 0$. Отсюда и из включения (4.19) следует, что

$$\left(A + \left(t + \frac{r_1}{k}\right)M\right) \cap C_k \neq \emptyset$$

для любого $t > 0$. Поэтому число $\varrho_k = \varrho_M(C_k, A)$ удовлетворяет неравенству

$$\varrho_k \leq \frac{r_1}{k} \text{ для любого } k \in \mathbb{N}. \quad (4.20)$$

Следовательно, существует индекс $k_0 \in \mathbb{N}$, такой что

$$\varrho_k < 1 - r \text{ для любого } k \geq k_0. \quad (4.21)$$

Поскольку $C_k + (1/k) \text{int } C = \text{int } C$ и $A \cap \text{int } C = \emptyset$, то

$$A \cap \left(C_k + \frac{1}{k} \text{int } C \right) = \emptyset.$$

Следовательно,

$$\inf_{a \in A, c \in C_k} \|a - c\| > 0.$$

Поэтому согласно лемме 4.1 для любого $k \in \mathbb{N}$ имеем $\varrho_k > 0$. Таким образом, используя соотношение (4.21), по теореме 4.1 для любого $k \geq k_0$ получаем, что существуют точки $a_k \in A$, $c_k \in C_k$, такие что $\mu_M(c_k - a_k) = \varrho_k$. Так как $a_k \in P_M(c_k, A)$, то векторы

$$z_k = \frac{c_k - a_k}{\mu_M(c_k - a_k)}$$

удовлетворяют включениям $z_k \in N_M^1(a_k, A)$ для любого $k \geq k_0$. Согласно лемме 3.2 последовательность $\{a_k\}$ ограниченная. Поэтому в силу M -квазиограниченности множества A получаем ограниченность последовательности $\{z_k\}$. Поскольку $c_k \in P_{-M}(a_k, C_k)$, то $-z_k \in N_{-M}(c_k, C_k)$ при $k \geq k_0$. Так как множество C_k — слагаемое квазишара $-(1 - 1/k)rM$, то в силу леммы 3.1 для любого $k \geq k_0$ справедливо включение

$$C_k - c_k \subset -\left(1 - \frac{1}{k}\right)r(M - z_k).$$

Используя равенства (4.18) и $c_k = a_k + \varrho_k z_k$, получаем

$$C \subset \frac{k}{k-1}(a_k + \varrho_k z_k) - rM + rz_k = a_k + rz_k + \frac{1}{k-1}(k\varrho_k z_k + a_k) - rM$$

при $k \geq k_0$. Полагая

$$\varepsilon_k = \frac{1}{k-1}\mu_{-M}(k\varrho_k z_k + a_k),$$

получаем включение

$$C \subset a_k + rz_k - (r + \varepsilon_k)M \text{ для любого } k \geq k_0. \quad (4.22)$$

Из неравенств (4.20) и ограниченности последовательностей $\{a_k\}$, $\{z_k\}$ следует, что $\lim_{k \rightarrow \infty} \varepsilon_k = 0$. Ввиду соотношений (1.1), (4.22) и равенств $\varrho_M(C, A) = 0$, $\varrho_M(a_k + rz_k < A) = r$ имеем

$$P_M^\varepsilon(C, A) = A \cap (C - \varepsilon M) \subset P_M^{\varepsilon + \varepsilon_k}(a_k + rz_k, A) \text{ для всех } k \geq k_0 \text{ и } \varepsilon > 0.$$

Применяя лемму 2.2 и учитывая ограниченность последовательностей $\{a_k\}$ и $\{z_k\}$, получаем, что

$$\text{diam } P_M^\varepsilon(C, A) \rightarrow 0 \text{ при } \varepsilon \rightarrow +0.$$

Повторяя рассуждения, проведённые в конце доказательства теоремы 4.1, получаем, что

$$\text{diam } P_{-M}^\varepsilon(A, C) \rightarrow 0 \text{ при } \varepsilon \rightarrow +0.$$

Согласно замечанию 4.1 теорема доказана. $\square$

Следующий пример показывает существенность условия M -квазиограниченности множества A в теореме 4.2. Рассмотрим в $E = \mathbb{R}^2$ множества

$$M = \{(x, y) \mid y \geq x^2 - 1\}, \quad A = \{(x, y) \mid x \leq 0, y \geq -1\}, \\ C = \{(x, y) \mid x \geq 0, y \leq -2x^2\}.$$

Тогда при $r = 1/2$ выполнены все условия теоремы 4.2 за исключением M -квазиограниченности множества A . При этом $A \cap C$ является отрезком с концами $(0, 0)$ и $(0, -1)$. Следовательно, в данном примере решение задачи (4.1) не единственно, а значит, эта задача не корректна (рис. 2).

Рис. 2

Теорема 4.3. Пусть в банаховом пространстве E квазишары B и M параболические и ограниченно равномерно выпуклые, причём квазишар B является слагаемым квазишара M . Пусть множество $A \subset E$ является M -квазиограниченным и слабо выпуклым относительно M . Тогда A является слабо выпуклым относительно B .

Доказательство. По предложению 2.1 достаточно доказать, что для любой точки $x_0 \in E$, удовлетворяющей неравенствам $0 < \varrho_B(x_0, A) < 1$, задача

$$\min_{a \in A} \mu_B(x_0 - a) \quad (4.23)$$

корректна. Зафиксируем произвольную точку $x_0 \in E$, такую что $0 < \varrho_B(x_0, A) < 1$. Пусть $\{a_k\}$ — минимизирующая последовательность этой задачи, т. е. $\{a_k\} \subset A$ и $\lim_{k \rightarrow \infty} \mu_B(x_0 - a_k) = \varrho_B(x_0, A)$. Обозначим

$$r = \varrho_B(x_0, A), \quad r_k = \mu_B(x_0 - a_k), \quad b_k = \frac{x_0 - a_k}{r_k}, \quad c_k = x_0 - r b_k, \quad C = x_0 - rB.$$

Тогда множество C является слагаемым квазишара $-rM$,

$$\text{int } C \neq \emptyset, \quad A \cap \text{int } C = \emptyset, \quad b_k \in \partial B, \quad c_k \in \partial C.$$

Поскольку $c_k - a_k = (r_k - r)b_k$, то $\mu_B(c_k - a_k) = (r_k - r)\mu_B(b_k) = r_k - r$. Так как множество B является слагаемым квазишара M , то найдётся точка b_0 , такая что $B \subset b_0 + M$. Следовательно, существует число $R > 0$, такое что $B \subset RM$. Поэтому

$$\mu_M(c_k - a_k) \leq R\mu_B(c_k - a_k) \leq R(r_k - r) \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty).$$

Поэтому $\varrho_M(C, A) = 0$, и по теореме 4.2 последовательность $\{a_k\}$ сходится. Таким образом, задача (4.23) корректна. $\square$

5. Корректность задачи об инфимальной конволюции

Напомним, что *надграфиком* функции

$$f: E \rightarrow \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$$

называется множество

$$\text{epi } f = \{(x, y) \in E \times \mathbb{R} \mid x \in E, y \geq f(x)\},$$

а *эффективное множество* f определяется равенством

$$\text{dom } f = \{x \in E \mid f(x) \in \mathbb{R}\}.$$

Инфимальной конволюцией [15, 23] функций

$$f: E \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}, \quad g: E \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$$

называется функция

$$(f \boxplus g)(x) = \inf_{u \in E} (f(x - u) + g(u)), \quad x \in E. \quad (5.1)$$

Замечание 5.1. Для любых функций $f, g: E \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ справедливы включения

$$\text{epi } f + \text{epi } g \subset \text{epi}(f \boxplus g) \subset \overline{\text{epi } f + \text{epi } g}.$$

Таким образом, инфимальная конволюция функций f и g — это функция, надграфик которой с точностью до замыкания совпадает с суммой Минковского надграфиков функций f и g . Некоторые свойства инфимальной конволюции описаны, например, в [3, 7].

Задача отыскания точки минимума в (5.1) весьма часто встречается в оптимизации. Инфимальную конволюцию можно рассматривать как задачу минимизации функции f с учётом штрафного слагаемого g и интерпретировать как обобщение регуляризации Моро—Иосиды [21, 26].

В этом разделе в терминах свойств слабой выпуклости будут получены достаточные условия корректности задачи (5.1), а также условия, при которых точка минимума в (5.1) существует, единственна и непрерывно зависит от параметров.

Р. Джанин [20] ввёл понятие РС2-функций, которые локально представимы в виде разности выпуклой функции и положительно определённой квадратичной функции. Р. Рокафеллар [24] рассматривал близкий к классу РС2 класс функций, обладающих нижним C^2 -свойством, для которых применимы методы субградиентной оптимизации. Ж.-Ф. Виаль [25] назвал функцию $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ слабо выпуклой, если для некоторого $r > 0$ функция $x \mapsto f(x) + r\|x\|^2$ выпукла. Известно, что если подобное определение использовать для функций в банаховом (негильбертовом) пространстве, то большинство полезных свойств таких функций, справедливых в гильбертовом пространстве, будет утрачено. В настоящей статье мы следуем работе [19], где предложено определить слабо выпуклую функцию как функцию, надграфик которой является слабо выпуклым множеством относительно некоторого квазишара.

Напомним, что *проксимальным субдифференциалом* функции

$$f: E \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$$

в точке $x \in \text{dom } f$ называется

$$\partial^P f(x) = \left\{ u \in E \mid (u, -1) \in N^P \left((x, f(x)), \text{epi } f \right) \right\}. \quad (5.2)$$

Пусть задана выпуклая непрерывная функция $\gamma: E \rightarrow \mathbb{R}$. Для любого числа $r > 0$ и любой функции $\gamma: E \rightarrow \mathbb{R}$ обозначим

$$\gamma_{(r)}(x) = r\gamma\left(\frac{x}{r}\right).$$

Заметим, что $\text{epi } \gamma_{(r)} = r \cdot \text{epi } \gamma$.

γ -*предифференциалом* функции $f: E \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ в точке $x \in \text{dom } f$ называется

$$\pi_\gamma f(x) = \{u \in \text{dom } \gamma \mid \text{ найдётся } r > 0, \text{ такое что } (f \boxplus \gamma_{(r)})(x + ru) = f(x) + \gamma_{(r)}(ru)\}. \quad (5.3)$$

Следующее предложение показывает связь между проксимальным субдифференциалом и γ -предифференциалом для $\gamma(x) = \sigma\|x\|^2$ в гильбертовом пространстве.

Предложение 5.1 [19, лемма 3.2]. Пусть функция $\gamma: E \rightarrow \mathbb{R}$ определена равенством $\gamma(x) = \sigma\|x\|^2$, $x \in E$, при некотором $\sigma > 0$. Пусть функция $f: E \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ такова, что $\text{dom}(f \boxplus \gamma) \neq \emptyset$ и $x_0 \in \text{dom } f$. Тогда

$$\partial^P f(x_0) = 2\sigma\pi_\gamma f(x_0).$$

Функция $f: E \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ называется *слабо выпуклой относительно функции γ* , если

$$(f \boxplus \gamma)(x + u) = f(x) + \gamma(u) \text{ для всех } x \in \text{dom } f \text{ и } u \in \pi_\gamma f(x). \quad (5.4)$$

Через $\mathcal{WC}(\gamma)$ будем обозначать класс полунепрерывных снизу функций, слабо выпуклых относительно функции γ .

Предложение 5.2 [19, теорема 3.5]. Пусть функция $\gamma: E \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ выпуклая и полунепрерывная снизу, $\gamma(0) < 0$ и $0 \in \text{int dom } \gamma$. Тогда для любой функции $f: E \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ следующие условия эквивалентны:

- 1) $f \in \mathcal{WC}(\gamma)$;
- 2) множество $\text{epi } f$ замкнутое и слабо выпуклое относительно квазишара $\text{epi } \gamma$.

Предложение 5.3 [19, теорема 3.4]. Пусть $E = H$ — гильбертово пространство, функция $\gamma: H \rightarrow \mathbb{R}$ определена равенством $\gamma(x) = \sigma\|x\|^2$ для некоторого $\sigma > 0$. Пусть функция $f: H \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ полунепрерывна снизу и $\text{dom } f \neq \emptyset$. Тогда следующие утверждения эквивалентны:

- 1) $\text{dom}(f \boxplus \gamma) \neq \emptyset$ и $f \in \mathcal{WC}(\gamma)$;
- 2) $f(x) - f(x_0) \geq \langle u, x - x_0 \rangle - \sigma\|x - x_0\|^2$ для всех $x_0 \in \text{dom } f$, $x \in H$, $u \in \partial^P f(x_0)$;
- 3) функция $x \mapsto f(x) + \gamma(x)$ выпукла.

Предложение 5.3 показывает, что в гильбертовом пространстве слабая выпуклость функции f относительно функции $\gamma(x) = \sigma\|x\|^2$ при некотором $\sigma > 0$ эквивалентна слабой выпуклости f в терминологии Ж.-Ф. Виалья и нижнему C^2 -свойству в терминологии Р. Рокафеллара [24].

Функция $\gamma: E \rightarrow \mathbb{R}$ называется *равномерно выпуклой* на выпуклом множестве $X \subset E$, если

$$\inf_{x_1, x_2 \in X: \|x_1 - x_2\| \geq \varepsilon} \left(f(x_1) + f(x_2) - 2f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \right) > 0 \text{ для любого } \varepsilon > 0.$$

Функция $\gamma: E \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ называется *коэрцитивной*, если

$$\lim_{\|x\| \rightarrow \infty} \frac{\gamma(x)}{\|x\|} = +\infty.$$

Следующее предложение даёт характеристику класса слабо выпуклых функций в терминах корректности задачи вида (5.1).

Предложение 5.4 [19, теоремы 3.6, 3.7]. Пусть E — банахово пространство, функция $\gamma: E \rightarrow \mathbb{R}$ коэрцитивная, ограниченная на любом ограниченном множестве и равномерно выпуклая на любом ограниченном множестве. Пусть функция $f: E \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ полунепрерывна снизу и $\text{dom}(f \boxplus \gamma) \neq \emptyset$. Тогда следующие условия эквивалентны:

- 1) $f \in \mathcal{WC}(\gamma)$;
- 2) для любых $r \in (0, 1)$ и $x_0 \in E$ задача

$$\min_{u \in E} (f(u) + \gamma_{(r)}(x_0 - u)) \quad (5.5)$$

корректна.

Через $\mathcal{SC}(\gamma)$ будем обозначать класс выпуклых полунепрерывных снизу функций $g: E \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, для каждой из которой существует выпуклая полунепрерывная снизу функция $g_1: E \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, удовлетворяющая равенству $g \boxplus g_1 = \gamma$.

Замечание 5.2. Используя замечание 5.1 и теорему 1.13.2 из [7], получаем, что если функция $\gamma: E \rightarrow \mathbb{R}$ выпуклая, непрерывная и коэрцитивная, $\gamma(0) < 0$, то функция g принадлежит классу $\mathcal{SC}(\gamma)$ тогда и только тогда, когда множество $\text{epi } g$ является слагаемым квазишара $\text{epi } \gamma$.

Замечание 5.3. Из [3, лемма 2.5.1] следует, что если $E = H$ — гильбертово пространство, $\gamma(x) = \sigma \|x\|^2$, функция $g: E \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ полунепрерывна снизу, $\text{dom } g \neq \emptyset$, то включение $g \in \mathcal{SC}(\gamma)$ эквивалентно выпуклости функции $x \mapsto g(x) - \gamma(x)$.

Для любого числа $R > 0$ рассмотрим следующую величину, обобщающую понятие хаусдорфова расстояния для неограниченных множеств:

$$h_R(A_1, A_2) = \max\{h^+(A_1 \cap \mathfrak{B}_R(0), A_2), h^+(A_2 \cap \mathfrak{B}_R(0), A_1)\}.$$

Пусть T — топологическое пространство. Многозначное отображение $F: T \rightarrow 2^E$ называется R -непрерывным в точке $t_0 \in T$, если для любых чисел $R > 0$ и $\varepsilon > 0$ существует такая окрестность $\mathcal{N}(t_0)$ точки t_0 , что $h_R(F(t), F(t_0)) < \varepsilon$ для любого $t \in \mathcal{N}(t_0)$.

Будем предполагать, что в пространстве $E \times \mathbb{R}$ введена норма, согласованная с нормой пространства E , такая что существуют числа $C_1 > 0$, $C_2 > 0$, при которых

$$C_1 \|z\| \leq \|z_x\| + \|z_y\| \leq C_2 \|z\| \quad \text{для всех } z_x \in E \text{ и } z_y \in \mathbb{R}, \quad z = (z_x, z_y). \quad (5.6)$$

В дальнейшем будем рассматривать функции $f: E \times T \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, такие что

$$\text{многозначное отображение } t \mapsto \text{epi } f(\cdot, t) \text{ } R\text{-непрерывно в точке } t_0 \in T. \quad (5.7)$$

Если функция $f(x, t)$ непрерывна по t в точке t_0 равномерно по x , т. е.

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \sup_{x \in E} |f(x, t) - f(x, t_0)| = 0, \quad (5.8)$$

то функция f удовлетворяет условию (5.7). Однако класс функций f , удовлетворяющих условию (5.7), значительно шире класса функций, удовлетворяющих условию (5.8). Например, при $E = \mathbb{R}$, $T = \mathbb{R}$, $t_0 \in \mathbb{R}$ функция $f(x, t) = tx^2$ или функция

$$f(x, t) = \begin{cases} \frac{1}{x-t}, & x > t, \\ +\infty, & x \leq t, \end{cases}$$

удовлетворяют условию (5.7), но не удовлетворяют условию (5.8).

Лемма 5.1. Пусть функция $f: E \times T \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ такова, что многозначное отображение $t \mapsto \text{epi } f(\cdot, t)$ является R -непрерывным в точке $t_0 \in T$, где t_0 — предельная точка T , и для любого $t \in T$ функция $f(\cdot, t): E \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ полунепрерывна снизу. Тогда

- 1) если функция $x: T \rightarrow E$ ограниченная и $\sup_{t \in T} |f(x(t), t)| < +\infty$, то существует функция $x': T \rightarrow E$, такая что

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \|x'(t) - x(t)\| = 0, \quad \limsup_{t \rightarrow t_0} (f(x'(t), t_0) - f(x(t), t)) \leq 0;$$

- 2) если $x_0 \in \text{dom } f(\cdot, t_0)$, то существует функция $x'': T \rightarrow E$, такая что

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \|x''(t) - x_0\| = 0, \quad \limsup_{t \rightarrow t_0} (f(x''(t), t) - f(x_0, t_0)) \leq 0.$$

Доказательство. Для любого $t \in T$ обозначим $y(t) = f(x(t), t)$, $z(t) = (x(t), y(t))$. Положим $R = \sup_{t \in T} \|z(t)\|$. Так как отображение $t \mapsto \text{epi } f(\cdot, t)$ является R -непрерывным в точке t_0 и $z(t) \in \text{epi } f(\cdot, t)$, то

$$\varrho(z(t), \text{epi } f(\cdot, t_0)) \leq h_R(\text{epi } f(\cdot, t), \text{epi } f(\cdot, t_0)) \rightarrow 0$$

при $t \rightarrow t_0$. Поскольку для любого $t \in T$ множество $\text{epi } f(\cdot, t)$ замкнуто, то для любого $t \in T$ найдётся точка $z'(t) = (x'(t), y'(t)) \in \text{epi } f(\cdot, t_0)$, такая что $\|z'(t) - z(t)\| \leq 2\varrho(z(t), \text{epi } f(\cdot, t_0))$. Отсюда и из соотношения (5.6) следует, что $\lim_{t \rightarrow t_0} \|x'(t) - x(t)\| = 0$ и $\lim_{t \rightarrow t_0} |y'(t) - y(t)| = 0$. Поэтому

$$\limsup_{t \rightarrow t_0} (f(x'(t), t_0) - f(x(t), t)) \leq \limsup_{t \rightarrow t_0} (y'(t) - y(t)) \leq 0.$$

Таким образом, первое утверждение доказано. Доказательство второго утверждения аналогично. $\square$

Лемма 5.2. Пусть E — банахово пространство, функция $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ удовлетворяет условию Липшица на любом ограниченном подмножестве пространства E , функция $\gamma: E \rightarrow \mathbb{R}$ выпукла, непрерывна, коэрцитивна и $\gamma(0) < 0$, $M = \text{epi } \gamma$. Тогда множество $\text{epi } f$ является M -квазиограниченным.

Доказательство. Обозначим

$$\gamma_{\min} = \inf_{x \in E} \gamma(x). \quad (5.9)$$

Из условий леммы следует, что $-\infty < \gamma_{\min} < 0$. Обозначим $A = \text{epi } f$. Пусть C_1, C_2 — коэффициенты из формулы (5.6). Зафиксируем произвольное число $R > 0$. По условию леммы существует число L_f , такое что

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq L_f \|x_1 - x_2\| \quad \text{для всех } x_1, x_2 \in \mathfrak{B}_{C_2 R+1}(0). \quad (5.10)$$

Обозначим

$$R_1 = \sup_{x \in E: \gamma(x) \leq L_f \|x\|} \|x\|. \quad (5.11)$$

Из коэрцитивности функции f следует неравенство $R_1 < +\infty$. Согласно определению 4.1 для завершения доказательства леммы требуется показать, что

$$\sup_{a \in \partial A \cap \mathfrak{B}_R(0)} \sup_{z \in N_M^1(a, A)} \|z\| < +\infty. \quad (5.12)$$

Зафиксируем произвольные $a \in \partial A \cap \mathfrak{B}_R(0)$ и $z \in N_M^1(a, A)$. Согласно равенству (2.1) существует число $t > 0$, такое что $a \in P_M(a + tz, A)$. Пусть $a = (a_x, a_y)$, $z = (z_x, z_y)$, где $a_x, z_x \in E$, $a_y, z_y \in \mathbb{R}$. Поскольку $a \in P_M(a + tz, A)$, то $a + t\lambda z \notin A$ для любого $\lambda \in (0, 1)$, т. е.

$$f(a_x + t\lambda z_x) > a_y + t\lambda z_y \quad \text{для любого } \lambda \in (0, 1).$$

С другой стороны, $a \in A$, т. е. $a_y \geq f(a_x)$. Следовательно,

$$f(a_x + t\lambda z_x) - f(a_x) > t\lambda z_y \quad \text{для любого } \lambda \in (0, 1). \quad (5.13)$$

Поскольку согласно соотношению (5.6) имеем $\|a_x\| \leq C_2 \|a\| \leq C_2 R$, то найдётся число $\lambda \in (0, 1)$, такое что $a_x + t\lambda z_x \in \mathfrak{B}_{C_2 R+1}(0)$. Отсюда и из соотношений (5.10), (5.13) следует неравенство

$$z_y \leq L_f \|z_x\|. \quad (5.14)$$

Так как $z = (z_x, z_y) \in M = \text{epi } \gamma$, то $z_y \geq \gamma(z_x)$. Отсюда и из неравенства (5.14) следует, что $\gamma(z_x) \leq L_f \|z_x\|$. Используя равенство (5.11), получаем неравенство $\|z_x\| \leq R_1$. Поэтому согласно соотношениям (5.6), (5.9), (5.14) приходим к неравенствам

$$\|z\| \leq \frac{\|z_x\| + |z_y|}{C_1} \leq \frac{R_1 + \max\{-\gamma_{\min}, L_f R_1\}}{C_1},$$

которые доказывают неравенство (5.12). $\square$

Теорема 5.1. Пусть E — банахово пространство, функция $\gamma: E \rightarrow \mathbb{R}$ коэрцитивна, ограничена на любом ограниченном множестве и равномерно выпукла на любом выпуклом ограниченном множестве. Пусть функция $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ удовлетворяет условию Липшица на любом ограниченном множестве и $f \in \mathcal{WC}(\gamma)$, $\text{dom}(f \boxplus \gamma) \neq \emptyset$. Пусть функция $g: E \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ удовлетворяет условию $g \in \mathcal{SC}(\gamma(r))$, $r \in (0, 1)$, $\text{int dom } g \neq \emptyset$. Тогда для любого $x \in E$ задача

$$\min_{u \in E} (f(x - u) + g(u))$$

корректна.

Доказательство. Без потери общности будем предполагать, что $\gamma(0) < 0$. Тогда $M = \text{epi } \gamma$ — квазишар. Так как функция γ непрерывна и коэрцитивна, то согласно [18, лемма 2.5] множество M параболично. В силу [19, лемма 10.1] равномерная выпуклость γ на любом выпуклом ограниченном множестве влечёт ограниченную равномерную выпуклость множества M . Зафиксируем произвольную точку $x_0 \in E$. Обозначим $y_0 = (f \boxplus g)(x_0)$. Покажем, что $y_0 \in \mathbb{R}$. Так как $\text{dom } f = E$, $\text{dom } g \neq \emptyset$, то $y_0 < +\infty$. Поскольку $\text{dom}(f \boxplus \gamma) \neq \emptyset$, то найдётся точка $x_1 \in E$, такая что $(f \boxplus \gamma)(x_1) = y_1 \in \mathbb{R}$. Так как $g \in \mathcal{SC}(\gamma_{(r)})$, то существует функция $g_1: E \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, такая что $g \boxplus g_1 = \gamma_{(r)}$. При этом найдётся точка $u_1 \in \text{dom } g_1$. Поскольку

$$f \boxplus \gamma = f \boxplus \gamma_{(r)} \boxplus \gamma_{(1-r)} = f \boxplus g \boxplus g_1 \boxplus \gamma_{(1-r)},$$

то

$$\begin{aligned} y_1 = (f \boxplus \gamma)(x_1) &\leq (f \boxplus g)(x_0) + g_1(u_1) + \gamma_{(1-r)}(x_1 - x_0 - u_1) = \\ &= y_0 + g_1(u_1) + \gamma_{(1-r)}(x_1 - x_0 - u_1). \end{aligned}$$

Следовательно, $y_0 > -\infty$, а значит, $y_0 \in \mathbb{R}$.

Обозначим $z_0 = (x_0, y_0)$ и рассмотрим множества $A = \text{epi } f$, $C = z_0 - \text{epi } g$. Из включений $f \in \mathcal{WC}(\gamma)$, $g \in \mathcal{SC}(\gamma_{(r)})$ согласно предложению 5.2 и замечанию 5.2 следует, что множество A слабо выпукло относительно квазишара M , а множество C является слагаемым квазишара $-rM$. По лемме 5.2 множество A является M -квазиограниченным. Так как функция g выпукла и полунепрерывна снизу, то она непрерывна на множестве $\text{int } \text{dom } g$. Следовательно, $\text{int } C \neq \emptyset$.

Предположим, что существует точка $(\tilde{x}, \tilde{y}) \in A \cap \text{int } C$. Тогда $\tilde{y} \geq f(\tilde{x})$, $(x_0 - \tilde{x}, y_0 - \tilde{y}) \in \text{int } \text{epi } g$, а значит, $g(x_0 - \tilde{x}) < y_0 - \tilde{y}$. Поэтому

$$y_0 = (f \boxplus g)(x_0) \leq f(\tilde{x}) + g(x_0 - \tilde{x}) \leq \tilde{y} + g(x_0 - \tilde{x}) < y_0.$$

Полученное противоречие показывает, что $A \cap \text{int } C = \emptyset$.

Пусть $\{u_k\}$ — минимизирующая последовательность в задаче

$$\min_{u \in E} (f(x_0 - u) + g(u)),$$

т. е.

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (f(x_0 - u_k) + g(u_k)) = y_0. \quad (5.15)$$

Для любого $k \in \mathbb{N}$ обозначим

$$w_k = (x_0 - u_k, f(x_0 - u_k)), \quad \tilde{w}_k = (x_0 - u_k, y_0 - g(u_k)).$$

Из соотношений (5.6), (5.15) следует, что $\|w_k - \tilde{w}_k\| \rightarrow 0$ при $k \rightarrow \infty$. Обозначим $\varepsilon_k = \mu_M(\tilde{w}_k - w_k)$. Тогда согласно замечанию 1.3 имеем $\lim_{k \rightarrow \infty} \varepsilon_k = 0$. Так как $w_k \in A$, $\tilde{w}_k \in C$, то $\varrho_M(C, A) \leq \varepsilon_k$, а значит, $\varrho_M(C, A) = 0$. По теореме 4.2 последовательность $\{w_k\}$ сходится. Поэтому последовательность $\{u_k\}$ также сходится. $\square$

Поскольку в теореме 5.1 в качестве функции g можно взять $\gamma_{(r)}$, то теорема 5.1 является усилением предложения 5.4.

Лемма 5.3. Пусть E — банахово пространство, функция $\gamma: E \rightarrow \mathbb{R}$ коэрцитивна, ограничена на любом ограниченном множестве и равномерно выпукла на любом ограниченном множестве. Пусть функция $g: E \times T \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ такова, что многозначное отображение $t \mapsto \text{epi } g(\cdot, t)$ является R -непрерывным в точке $t_0 \in T$ и для любого $t \in T$ функция $g(\cdot, t): E \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ полунепрерывна снизу, $g(\cdot, t) \in \mathcal{SC}(\gamma)$, $\text{int dom } g(\cdot, t) \neq \emptyset$. Тогда для любого $t \in T$ существует точка $v(t) \in E$, такая что

$$g(v(t), t) = g^{\min}(t) := \inf_{v \in E} g(v, t)$$

и функции $v(\cdot)$, $g^{\min}(\cdot)$ непрерывны в точке t_0 .

Доказательство. Для любого $t \in T$ согласно теореме 5.1, применённой к функциям $f(x) = 0$ и $g(x) = g(x, t)$, задача $\min_{v \in E} g(v, t)$ корректна. Следовательно, для любого $t \in T$ существует вектор $v(t) \in E$, такой что $g(v(t), t) = g^{\min}(t)$. Если t_0 — изолированная точка пространства T , то доказываемое утверждение тривиально выполнено. Будем предполагать, что t_0 — предельная точка пространства T . По лемме 5.1(2) существует функция $u: T \rightarrow E$, такая что

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \|u(t) - v(t_0)\| = 0, \quad (5.16)$$

$$\limsup_{t \rightarrow t_0} g(u(t), t) \leq g(v(t_0), t_0) = g^{\min}(t_0). \quad (5.17)$$

Для любого $t \in T$ определим

$$\tilde{v}(t) = \begin{cases} v(t), & \|v(t) - u(t)\| \leq 1, \\ u(t) + \frac{v(t) - u(t)}{\|v(t) - u(t)\|}, & \|v(t) - u(t)\| > 1, \end{cases} \quad (5.18)$$

$$\tilde{g}(t) = \max\{g(\tilde{v}(t), t), g^{\min}(t_0)\}.$$

Тогда $\tilde{v}(t) \in [u(t), v(t)]$ для любого $t \in T$, и ввиду выпуклости функции $g(\cdot, t)$ имеем

$$g(\tilde{v}(t), t) \leq \max\{g(v(t), t), g(u(t), t)\} \leq g(u(t), t).$$

Отсюда и из (5.17) следует, что

$$\limsup_{t \rightarrow t_0} g(\tilde{v}(t), t) \leq g^{\min}(t_0),$$

а значит,

$$\limsup_{t \rightarrow t_0} \tilde{g}(t) \leq g^{\min}(t_0).$$

Используя утверждение 1) леммы 5.1 и ограниченность функции $(\tilde{v}(t), \tilde{g}(t))$ в некоторой окрестности точки t_0 , получаем, что существует функция $w: T \rightarrow E$, такая что

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \|w(t) - \tilde{v}(t)\| = 0, \quad \limsup_{t \rightarrow t_0} (g(w(t), t_0) - \tilde{g}(t)) \leq 0. \quad (5.19)$$

Следовательно,

$$\limsup_{t \rightarrow t_0} g(w(t), t_0) \leq g^{\min}(t_0) = g(v(t_0), t_0). \quad (5.20)$$

Так как функция γ равномерно выпукла на любом ограниченном множестве и коэрцитивна, то задача $\min_{x \in E} \gamma(x)$ корректна. Отсюда и из условия $g(\cdot, t_0) \in \mathcal{SC}(\gamma)$ следует корректность задачи $\min_{x \in E} g(x, t_0)$. Поэтому ввиду соотношения (5.20) имеем, что $\lim_{t \rightarrow t_0} \|w(t) - v(t_0)\| = 0$. Используя первое из равенств (5.19), получаем, что $\lim_{t \rightarrow t_0} \|\tilde{v}(t) - v(t_0)\| = 0$. Принимая во внимание равенства (5.16) и (5.18), приходим к равенству $\lim_{t \rightarrow t_0} \|v(t) - v(t_0)\| = 0$. Итак, функция $v(\cdot)$ непрерывна в точке t_0 .

Согласно утверждению 1) леммы 5.1 существует функция $v': T \rightarrow E$, такая что

$$\limsup_{t \rightarrow t_0} (g(v'(t), t_0) - g(v(t), y)) \leq 0.$$

Следовательно, используя неравенство (5.17), получаем, что

$$\begin{aligned} g^{\min}(t_0) &\leq \liminf_{t \rightarrow t_0} g(v'(t), t_0) \leq \liminf_{t \rightarrow t_0} g(v(t), t) = \liminf_{t \rightarrow t_0} g^{\min}(t) \leq \\ &\leq \limsup_{t \rightarrow t_0} g^{\min}(t) \leq \limsup_{t \rightarrow t_0} g(u(t), t) \leq g^{\min}(t_0). \end{aligned}$$

Итак, $\lim_{t \rightarrow t_0} g^{\min}(t) = g^{\min}(t_0)$, что доказывает непрерывность функции $g^{\min}(\cdot)$ в точке t_0 . $\square$

Наряду с операцией инфимальной конволюции (5.1) (которую также называют операцией эписуммы [3, 7]), будем рассматривать операцию *эпипразности* функций f и g :

$$(f \boxplus g)(x) = \sup_{v \in E} (f(x + v) - g(v)), \quad x \in E.$$

Лемма 5.4. Пусть выпуклая полунепрерывная снизу функция $\gamma: E \rightarrow \mathbb{R}$ такова, что задача $\min_{x \in E} \gamma(x)$ корректна и точка $x_0 \in E$ является точкой минимума в этой задаче. Пусть $g \in \mathcal{SC}(\gamma)$ и точка $v_0 \in E$ является точкой минимума функции g . Тогда

$$(\gamma \boxplus g)(x_0 - v_0) = \gamma(x_0) - g(v_0).$$

Доказательство. Так как $g \in \mathcal{SC}(\gamma)$, то существует выпуклая полунепрерывная снизу функция $g_1: E \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, удовлетворяющая равенству $g \boxplus g_1 = \gamma$. Следовательно,

$$\inf_{v \in E} g(v) + \inf_{w \in E} g_1(w) = \inf_{x \in E} \gamma(x).$$

По определению инфимума найдётся последовательность $\{u_k\} \subset E$, такая что

$$\lim_{k \rightarrow \infty} g_1(u_k) = \inf_{w \in E} g_1(w).$$

Поэтому

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} \gamma(v_0 + u_k) &= \lim_{k \rightarrow \infty} (g \boxplus g_1)(v_0 + u_k) \leq \\ &\leq g(v_0) + \lim_{k \rightarrow \infty} g_1(u_k) = \inf_{v \in E} g(v) + \inf_{w \in E} g_1(w) = \inf_{x \in E} \gamma(x). \end{aligned} \quad (5.21)$$

Таким образом, последовательность $\{v_0 + u_k\}$ является минимизирующей в задаче $\min_{x \in E} \gamma(x)$. Ввиду корректности данной задачи эта последовательность сходится к точке x_0 , т. е. $u_k \rightarrow x_0 - v_0$ при $k \rightarrow \infty$. Поскольку функция g_1 полунепрерывна снизу, то $g_1(x_0 - v_0) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} g_1(u_k)$. Отсюда и из соотношений (5.21) получаем, что $g(v_0) + g_1(x_0 - v_0) \leq \gamma(x_0)$. Итак, для любой точки $v \in E$

$$\gamma(v - v_0 + x_0) = (g \boxplus g_1)(v - v_0 + x_0) \leq g(v) + g_1(x_0 - v_0) \leq g(v) - g(v_0) + \gamma(x_0),$$

что завершает доказательство. $\square$

В лемме 5.5 сформулированы достаточные условия равномерной по параметру t ограниченности точки минимума в следующей задаче об инфимальной конволюции с параметром:

$$\min_{u \in E} (f(x(t) - u, t) + g(u, t)). \quad (5.22)$$

Идея доказательства леммы 5.5 близка к идее доказательства леммы 2.5 работы [18] о том, что надграфик выпуклой непрерывной коэрцитивной функции является параболическим.

Лемма 5.5. Пусть функция $\gamma: E \rightarrow \mathbb{R}$ выпуклая, коэрцитивная и ограниченная на любом ограниченном множестве, $r \in (0, 1)$. Пусть заданы функции $f: E \times T \rightarrow \mathbb{R}$ и $g: E \times T \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ и функции $u, v, w, x: T \rightarrow E$, такие что

$$\sup_{t \in T} \|x(t)\| = C_x < +\infty, \quad \sup_{t \in T} \|v(t)\| = C_v < +\infty, \quad \sup_{t \in T} \|w(t)\| = C_w < +\infty,$$

$$\inf_{t \in T} (f(\cdot, t) \boxplus \gamma)(0) = C_f^- > -\infty,$$

$$\sup_{t \in T} \sup_{x \in \mathfrak{B}_R(0)} f(x, t) = C_f^+(R) < +\infty \text{ для любого } R > 0,$$

$$\sup_{t \in T} g(v(t), t) = C_g^+ < +\infty, \quad \sup_{t \in T} (\gamma(r) \boxplus g(\cdot, t))(w(t)) = C_g^- < +\infty,$$

$$(f(\cdot, t) \boxplus g(\cdot, t))(x(t)) = f(x(t) - u(t), t) + g(u(t), t) \text{ для любого } t \in T.$$

Тогда

$$\sup_{t \in T} \|u(t)\| < +\infty.$$

Доказательство. По определению операций эписуммы и эпизности и из условий леммы для любого $t \in T$ имеем

$$\begin{aligned} f(x(t) - u(t), t) + g(u(t), t) &= \\ &= (f(\cdot, t) \boxplus g(\cdot, t))(x(t)) \leq f(x(t) - v(t), t) + g(v(t), t) \leq C_f^+(C_x + C_v) + C_g^+, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(x(t) - u(t)) + \gamma(u(t) - x(t)) &\geq (f(\cdot, t) \boxplus \gamma)(0) \geq C_f^-, \\ \gamma_{(r)}(w(t) + u(t)) - g(u(t), t) &\leq (\gamma_{(r)} \boxminus g(\cdot, t))(w(t)) \leq C_g^-. \end{aligned}$$

Поэтому

$$\begin{aligned} \gamma_{(r)}(w(t) + u(t)) - \gamma(u(t) - x(t)) &\leq C_f^+(C_x + C_v) - C_f^- + C_g^+ + C_g^- \\ &\text{для любого } t \in T. \end{aligned} \quad (5.23)$$

Определим множество

$$T_1 = \{t \in T \mid r\|u(t)\| > 1\}. \quad (5.24)$$

Если $T_1 = \emptyset$, то доказываемое утверждение справедливо. Поэтому будем предполагать, что $T_1 \neq \emptyset$. Для любого $t \in T_1$ обозначим

$$\varepsilon(t) = \frac{1}{\|u(t)\|}, \quad b(t) = \frac{1}{1 - r + \varepsilon(t)} \left(\frac{\varepsilon(t)}{r} u(t) - x(t) - \frac{r - \varepsilon(t)}{r} w(t) \right).$$

Тогда $\varepsilon(t) < r$ и

$$u(t) - x(t) = (r - \varepsilon(t)) \frac{w(t) + u(t)}{r} + (1 - r + \varepsilon(t)) b(t),$$

то в силу выпуклости функции γ имеем

$$\gamma(u(t) - x(t)) \leq \frac{r - \varepsilon(t)}{r} \gamma_{(r)}(u(t) + w(t)) + (1 - r + \varepsilon(t)) \gamma(b(t)) \quad \text{для любого } t \in T_1.$$

Отсюда и из неравенства (5.23) следует, что

$$\begin{aligned} \varepsilon(t) \gamma(u(t) - x(t)) &\leq (r - \varepsilon(t)) (C_f^+(C_x + C_v) - C_f^- + C_g^+ + C_g^-) + \\ &\quad + r(1 - r + \varepsilon(t)) \gamma(b(t)) \quad \text{для любого } t \in T_1. \end{aligned}$$

Поскольку

$$\sup_{t \in T_1} \|b(t)\| \leq \frac{1}{1 - r} \left(\frac{1}{r} + C_x + C_w \right) < +\infty,$$

а функция γ ограниченная на любом ограниченном множестве, то

$$\sup_{t \in T_1} \gamma(b(t)) < +\infty.$$

Следовательно,

$$\sup_{t \in T_1} \frac{\gamma(u(t) - x(t))}{\|u(t)\|} = \sup_{t \in T_1} \varepsilon(t) \gamma(u(t) - x(t)) < +\infty.$$

Ввиду коэрцитивности функции γ и ограниченности функции x

$$\sup_{t \in T_1} \|u(t)\| < +\infty.$$

Отсюда и из равенства (5.24) получаем доказываемое утверждение. $\square$

Следующая теорема утверждает, что если функции $f(x, t)$, $g(x, t)$ и $x(t)$ непрерывны по t в том смысле, что многозначные отображения $t \mapsto \text{epi } f(\cdot, t)$ и $t \mapsto \text{epi } g(\cdot, t)$ R -непрерывны, причём для каждого t функции $f(\cdot, t)$ и $g(\cdot, t)$ удовлетворяют соответствующим условиям слабой и сильной выпуклости, то точка минимума в инфимальной конволюции (5.22) непрерывно зависит от t .

Теорема 5.2. Пусть E — банахово пространство, функция $\gamma: E \rightarrow \mathbb{R}$ коэрцитивна, ограничена на любом ограниченном множестве и равномерно выпукла на любом выпуклом ограниченном множестве. Пусть функции $f: E \times T \rightarrow \mathbb{R}$ и $g: E \times T \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ таковы, что многозначные отображения $t \mapsto \text{epi } f(\cdot, t)$ и $t \mapsto \text{epi } g(\cdot, t)$ являются R -непрерывными в точке $t_0 \in T$. Пусть $f(\cdot, t) \in \mathcal{WC}(\gamma)$ и $g(\cdot, t) \in \mathcal{SC}(\gamma_{(r)})$ для любого $t \in T$, где $r \in (0, 1)$ не зависит от t . Пусть для любого числа $R > 0$ существует число $L(R) \in \mathbb{R}$, такое что для каждого $t \in T$ функция $f(\cdot, t)$ удовлетворяет условию Липшица с константой $L(R)$ на шаре $\mathfrak{B}_R(0)$. Пусть

$$\inf_{t \in T} \inf_{x \in E} (f(x, t) + \gamma(-x)) = C > -\infty \quad (5.25)$$

и $\text{int } \text{dom } g(\cdot, t) \neq \emptyset$ для любого $t \in T$. Пусть функция $x: T \rightarrow E$ непрерывна в точке t_0 . Тогда для любого $t \in T$ существует и единственна точка $u(t) \in E$, такая что

$$f(x(t) - u(t), t) + g(u(t), t) = \min_{u \in E} (f(x(t) - u, t) + g(u, t)). \quad (5.26)$$

При этом функция $u(\cdot)$ непрерывна в точке t_0 .

Доказательство. По теореме 5.1 для каждого $t \in T$ существует и единственна точка $u(t) \in E$, удовлетворяющая равенству (5.26). Покажем, что

$$\limsup_{t \rightarrow t_0} \|u(t)\| < +\infty. \quad (5.27)$$

Согласно лемме 5.3 для любого $t \in T$ существует точка $v(t) \in E$, такая что

$$g(v(t), t) = g^{\min}(t) := \inf_{v \in E} g(v, t)$$

и функции $v(\cdot)$, $g^{\min}(\cdot)$ непрерывны в точке t_0 . Применяя теорему 5.1 для $f(x) = 0$, $g(x) = \gamma_{(r)}(x)$, получаем корректность задачи $\min_{x \in E} \gamma(x)$. Поэтому существует $x_0 \in E$ — точка минимума функции γ , и по лемме 5.4 имеем

$$\begin{aligned} (\gamma_{(r)} \boxplus g(\cdot, t))(x_0 - v(t)) &= \gamma_{(r)}(x_0) - g(v(t), t) = \\ &= \gamma_{(r)}(x_0) - g^{\min}(t) \quad \text{для любого } t \in T. \end{aligned}$$

Отсюда и из непрерывности функции $g^{\min}(\cdot)$ в точке t_0 получаем, что

$$\limsup_{t \rightarrow t_0} (\gamma_{(r)} \boxplus g(\cdot, t))(x_0 - v(t)) < +\infty, \quad \limsup_{t \rightarrow t_0} g(v(t), t) = \limsup_{t \rightarrow t_0} g^{\min}(t) < +\infty. \quad (5.28)$$

Ввиду R -непрерывности многозначного отображения $t \mapsto \text{epi } f(\cdot, t)$ в точке t_0 согласно лемме 5.1(2) найдётся функция $a: T \rightarrow E$, такая что

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \|a(t)\| = 0, \quad \limsup_{t \rightarrow t_0} f(a(t), t) \leq f(0, t_0).$$

Поэтому существует такая окрестность $\mathcal{N}$ точки t_0 , что

$$\|a(t)\| < 1, \quad f(a(t), t) \leq f(0, t_0) + 1 \quad \text{для любого } t \in \mathcal{N}. \quad (5.29)$$

Поскольку для любого $t \in T$ функция $f(\cdot, t)$ удовлетворяет условию Липшица с константой $L(R + 1)$ на шаре $\mathfrak{B}_{R+1}(0)$, то, используя соотношение (5.29), получаем

$$\sup_{t \in \mathcal{N}} \sup_{x \in \mathfrak{B}_R(0)} f(x, t) \leq \sup_{t \in \mathcal{N}} f(a(t), t) + (R + 1) \cdot L(R + 1) < +\infty.$$

Применяя лемму 5.5 и учитывая соотношения (5.25), (5.28), получаем существование такой окрестности $\mathcal{N}' \subset \mathcal{N}$ точки t_0 , что

$$\sup_{t \in \mathcal{N}'} \|u(t)\| < +\infty.$$

Это доказывает неравенство (5.27). Используя соотношения

$$\begin{aligned} f(x(t) - u(t), t) + g(u(t), t) &= (f(\cdot, t) \boxplus g(\cdot, t))(x(t)) \leq \\ &\leq f(x(t) - v(t), t) + g(v(t), t) = f(x(t) - v(t), t) + g^{\min}(t), \end{aligned}$$

$$\limsup_{t \rightarrow t_0} \|x(t)\| < +\infty, \quad \limsup_{t \rightarrow t_0} \|u(t)\| < +\infty, \quad \limsup_{t \rightarrow t_0} \|v(t)\| < +\infty$$

и условие Липшица на любом ограниченном множестве для функций $f(\cdot, t)$ с константой, не зависящей от t , получаем неравенство

$$\limsup_{t \rightarrow t_0} g(u(t), t) < +\infty. \quad (5.30)$$

По лемме 5.1 ввиду R -непрерывности многозначного отображения $t \mapsto \text{epi } g(\cdot, t)$ в точке t_0 найдутся функции $u', u'': T \rightarrow E$, такие что

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow t_0} \|u'(t) - u(t)\| &= 0, \quad \limsup_{t \rightarrow t_0} (g(u'(t), t_0) - g(u(t), t)) \leq 0, \\ \lim_{t \rightarrow t_0} \|u''(t) - u(t_0)\| &= 0, \quad \limsup_{t \rightarrow t_0} (g(u''(t), t) - g(u(t_0), t_0)) \leq 0. \end{aligned}$$

По лемме 5.1 ввиду R -непрерывности многозначного отображения $t \mapsto \text{epi } f(\cdot, t)$ в точке t_0 найдутся функции $v', v'': T \rightarrow E$, такие что

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow t_0} \|v'(t) - x(t) + u(t)\| &= 0, \quad \limsup_{t \rightarrow t_0} (f(v'(t), t_0) - f(x(t) - u(t), t)) \leq 0, \\ \lim_{t \rightarrow t_0} \|v''(t) - x(t_0) + u(t_0)\| &= 0, \quad \limsup_{t \rightarrow t_0} (f(v''(t), t) - f(x(t_0) - u(t_0), t_0)) \leq 0. \end{aligned}$$

Отсюда согласно условию Липшица для функций $f(\cdot, t)$ имеем

$$\begin{aligned} \limsup_{t \rightarrow t_0} (f(x(t_0) - u'(t), t_0) - f(x(t) - u(t), t)) &\leq 0, \\ \limsup_{t \rightarrow t_0} (f(x(t) - u''(t), t) - f(x(t_0) - u(t_0), t_0)) &\leq 0. \end{aligned}$$

Используя равенство (5.26), получаем

$$\begin{aligned} \limsup_{t \rightarrow t_0} (f(x(t_0) - u'(t), t_0) + g(u'(t), t_0)) &\leq \limsup_{t \rightarrow t_0} (f(x(t) - u(t), t) + g(u(t), t)) \leq \\ &\leq \limsup_{t \rightarrow t_0} (f(x(t) - u''(t), t) + g(u''(t), t)) \leq \\ &\leq f(x(t_0) - u(t_0), t_0) + g(u(t_0), t_0) = \min_{u \in E} (f(x(t_0) - u, t_0) + g(u, t_0)). \end{aligned}$$

Поэтому для любого $k \in \mathbb{N}$ найдётся такая окрестность $\mathcal{N}_k$ точки t_0 , что

$$\begin{aligned} f(x(t_0) - u'(t), t_0) + g(u'(t), t_0) &\leq \\ &\leq \min_{u \in E} (f(x(t_0) - u, t_0) + g(u, t_0)) + \frac{1}{k} \text{ для любого } t \in \mathcal{N}_k. \end{aligned} \quad (5.31)$$

Покажем, что

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \|u'(t) - u(t_0)\| = 0. \quad (5.32)$$

Предположим, что соотношение (5.32) не выполнено, т. е.

$$\varepsilon_0 := \limsup_{t \rightarrow t_0} \|u'(t) - u(t_0)\| > 0.$$

Тогда для любого $k \in \mathbb{N}$ найдётся элемент $t_k \in \mathcal{N}_k$, такой что $\|u'(t_k) - u(t_0)\| > \varepsilon_0/2$. Так как $t_k \in \mathcal{N}_k$, то согласно соотношению (5.31) последовательность $\{u'(t_k)\}$ является минимизирующей в задаче

$$\min_{u \in E} (f(x(t_0) - u, t_0) + g(u, t_0)).$$

Согласно теореме 5.1 последовательность $\{u'(t_k)\}$ сходится к $u(t_0)$, что противоречит неравенству $\|u'(t_k) - u(t_0)\| > \varepsilon_0/2$. Противоречие доказывает соотношение (5.32), которое вместе с равенством $\lim_{t \rightarrow t_0} \|u'(t) - u(t)\| = 0$ доказывает непрерывность функции $u(\cdot)$ в точке t_0 . $\square$

Литература

- [1] Алимов А. Р., Карлов М. И. Множества с внешним чебышёвским слоем // *Мат. заметки*. — 2001. — Т. 69, № 2. — С. 303–307.
- [2] Балашов М. В., Иванов Г. Е. Слабо выпуклые и проксимально гладкие множества в банаховых пространствах // *Изв. РАН. Сер. мат.* — 2009. — Т. 73, № 3. — С. 23–66.
- [3] Иванов Г. Е. Слабо выпуклые множества и функции: теория и приложения. — М.: Физматлит, 2006.
- [4] Иванов Г. Е. Критерий гладких порождающих множеств // *Мат. сб.* — 2007. — Т. 198, № 3. — С. 51–76.
- [5] Иванов Г. Е., Лопушански М. С. Аппроксимативные свойства слабо выпуклых множеств в пространствах с несимметричной полунормой // *Тр. МФТИ*. — 2012. — Т. 4, № 4. — С. 94–104.
- [6] Левитин Е. С., Поляк Б. Т. Методы минимизации при наличии ограничений // *ЖВМ и МФ*. — 1966. — Т. 6, № 5. — С. 787–823.

- [7] Половинкин Е. С., Балашов М. В. Элементы выпуклого и сильно выпуклого анализа. — М.: Физматлит, 2007.
- [8] Balashov M. V., Repovš D. Uniform convexity and the splitting problem for selections // *J. Math. Anal. Appl.* — 2009. — Vol. 360, no. 1. — P. 307–316.
- [9] Bernard F., Thibault L., Zlateva N. Characterization of proximal regular sets in super reflexive Banach spaces // *J. Convex Anal.* — 2006. — Vol. 13. — P. 525–559.
- [10] Bernard F., Thibault L., Zlateva N. Prox-regular sets and epigraphs in uniformly convex Banach spaces: Various regularities and other properties // *Trans. Am. Math. Soc.* — 2011. — Vol. 363. — P. 2211–2247.
- [11] Clarke F. H., Stern R. J., Wolenski P. R. Proximal smoothness and lower- C^2 property // *J. Convex Anal.* — 1995. — Vol. 2. — P. 117–144.
- [12] Clarkson J. A. Uniformly convex spaces // *Trans. Am. Math. Soc.* — 1936. — Vol. 40. — P. 396–414.
- [13] Colombo G., Goncharov V. V., Mordukhovich B. S. Well-posedness of minimal time problems with constant dynamics in Banach spaces // *Set-Valued Var. Anal.* — 2010. — Vol. 18, no. 3-4. — P. 349–372.
- [14] Federer H. Curvature measures // *Trans. Am. Math. Soc.* — 1959. — Vol. 93. — P. 418–491.
- [15] Fenchel W. *Convex Cones, Sets and Functions: Mimeographed Lect. Notes.* — Princeton: Princeton Univ., 1951.
- [16] Goncharov V. V., Pereira F. F. Neighbourhood retractions of nonconvex sets in a Hilbert space via sublinear functionals // *J. Convex Anal.* — 2011. — Vol. 18. — P. 1–36.
- [17] Goncharov V. V., Pereira F. F. Geometric conditions for regularity in a time-minimum problem with constant dynamics // *J. Convex Anal.* — 2012. — Vol. 19. — P. 631–669.
- [18] Ivanov G. E. On well posed best approximation problems for a nonsymmetric seminorm // *J. Convex Anal.* — 2013. — Vol. 20, no. 2. — P. 501–529.
- [19] Ivanov G. E. Weak convexity of sets and functions in a Banach space // *J. Convex Anal.* — 2015. — Vol. 22, No. 2.
- [20] Janin R. Sur la dualité et la sensibilité dans les problèmes de programmation mathématique: Thèse de Doctorat ès-Sciences Mathématiques. — Université de Paris, 1974.
- [21] Moreau J. J. Proximité et dualité dans un espace hilbertien // *Bull. Soc. Math. Fr.* — 1965. — Vol. 93. — P. 273–299.
- [22] Poliquin R. A., Rockafellar R. T., Thibault L. Local differentiability of distance functions // *Trans. Am. Math. Soc.* — 2000. — Vol. 352. — P. 5231–5249.
- [23] Rockafellar R. T. *Convex Analysis.* — Princeton, 1970.
- [24] Rockafellar R. T. Favorable classes of Lipschitz continuous functions in subgradient optimization // *Progress in Nondifferentiable Optimization / E. Nurminski (ed.). — IIASA Collaborative Proc. Ser., — Laxenburg, Austria: Int. Inst. Appl. Systems Anal., 1982. — P. 125–144.*
- [25] Vial J.-P. Strong and weak convexity of sets and functions // *Math. Oper. Res.* — 1983. — Vol. 8. — P. 231–259.
- [26] Yosida K. *Functional Analysis.* — Berlin: Springer, 1964.