

Лекция 4

1.7 Положительные элементы

Определение 1.32. Самосопряженный элемент a в C^* -алгебре A с единицей называется *положительным*, если $\text{Sp}(a) \subset [0, \infty)$. Если у A нет единицы, то a называется *положительным*, если он положителен в A^+ .

Положительность записывается как $a \geq 0$. Для двух самосопряженных элементов $a, b \in A$ мы говорим, что $a \geq b$, если $a - b \geq 0$.

Задача 29. Показать, что если $a \geq 0$ и $0 \geq a$, то $a = 0$; а также, что $-\|a\|1 \leq a \leq \|a\|1$ для всякого самосопряженного a .

Теперь рассмотрим другие применения непрерывного функционального исчисления к положительности.

Следствие 1.33. Пусть $a \in A$ — положительный элемент. Тогда существует единственный положительный квадратный корень b из a , то есть такой $b \geq 0$, что $b^2 = a$.

Доказательство. Функция $f(z) = \sqrt{z}$ определена и непрерывна на $[0, \infty)$, поэтому $b = f(a)$ определен. Он самосопряжен и даже положителен (поскольку f отображает $[0, \infty)$ в себя) и $b^2 = f(a)^2 = a$ (по следствию 1.28). Если c — другой положительный квадратный корень из a , то $c = f(c^2) = f(a) = b$. \square

Следствие 1.34. Пусть $a \in A$ — самосопряженный элемент. Тогда имеются такие положительные элементы $a_+, a_- \in A$, что $a = a_+ - a_-$ и $a_+ a_- = 0$.

Доказательство. Определим непрерывную функцию $f : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$, положив $f(x) = x$ при $x \geq 0$ и $f(x) = 0$ при $x < 0$. Обозначим $g(x) = f(-x)$. Эти функции удовлетворяют $f(x) - g(x) = x$ и $f(x)g(x) = 0$. Остается положить $a_+ = f(a)$, $a_- = g(a)$. \square

Следствие 1.35. Для самосопряженного элемента $a \in A$ следующие условия эквивалентны:

- (i) $a \geq 0$;
- (ii) $a = b^2$ для некоторого самосопряженного b ;
- (iii) $\|\mu 1 - a\| \leq \mu$ для всякого $\mu \geq \|a\|$;
- (iv) $\|\mu 1 - a\| \leq \mu$ для некоторого $\mu \geq \|a\|$.

Доказательство. По следствию 1.33, из (i) следует (ii). Кроме того, из (iii) следует (iv) по очевидным соображениям.

Покажем, что из (ii) следует (iii). По предположению, $a = f(b)$, где $f(x) = x^2$. При этом норма f на $\text{Sp}(b)$ равна $\|a\|$, так что $0 \leq \mu - x^2 \leq \mu$ при любом $\mu \geq \|a\|$ и $x \in \text{Sp}(b)$. Поскольку $\mu 1 - a = (\mu - f)(b)$, то $\|(\mu - f)(b)\|$ равняется норме $\mu - f$ на $\text{Sp}(b)$, которая не превосходит μ .

Покажем наконец, что из (iv) следует (i). Поскольку для некоторого $\mu \geq \|a\|$ выполнено $\|\mu - x\| = \sup_{x \in \text{Sp}(a)} |\mu - x| \leq \mu$, то ни одно $x \in \text{Sp}(a)$ не может быть отрицательным. \square

Следствие 1.36. *Если a и b положительны, то и $a + b$ положителен.*

Доказательство. Выберем некоторые $\mu \geq \|a\|$, $\nu \geq \|b\|$. Тогда $\|a + b\| \leq \mu + \nu$ и по пункту (iii) следствия 1.35

$$\|(\mu + \nu)1 - (a + b)\| = \|(\mu 1 - a) + (\nu 1 - b)\| \leq \|\mu 1 - a\| + \|\nu 1 - b\| \leq \mu + \nu.$$

Поэтому по пункту (iv) следствия 1.35, $a + b$ положителен. \square

Задача 30. Если $0 \leq a \leq b$, то $\|a\| \leq \|b\|$. *Указание:* Как мы знаем, $b \leq \|b\| \cdot 1_A$. Значит, $a \leq \|b\| \cdot 1_A$, то есть, $\text{Sp}(\|b\| \cdot 1_A - a) \subset [0, +\infty)$. Из $\text{Sp}(\mu 1_A - a) = \mu - \text{Sp}(a)$ выведите, что $\|a\| = \max\{\lambda \in \text{Sp}(a)\}$ равно $\min\{\mu: \text{Sp}(\mu \cdot 1_A - a) \subset [0, +\infty)\}$. Отсюда следует утверждение.

Следующее предложение 1.38 практически очевидно для операторов в гильбертовом пространстве, но весьма нетривиально для элементов C^* -алгебры. Нам понадобится следующий результат о спектрах произведений.

Лемма 1.37. *Если $a, b \in A$, то $\text{Sp}(ab) \cup \{0\} = \text{Sp}(ba) \cup \{0\}$.*

Доказательство. Пусть $0 \neq \lambda \notin \text{Sp}(ab)$. Это значит, что $(ab - \lambda 1) = -\lambda(1 - \lambda^{-1}ab)$ обратим, так что существует такой элемент $u \in A$, что $(1 - \lambda^{-1}ab)u = 1$. Положим $v = 1 + \lambda^{-1}bua$. Тогда

$$\begin{aligned} (1 - \lambda^{-1}ba)v &= (1 - \lambda^{-1}ba)(1 + \lambda^{-1}bua) = 1 - \lambda^{-1}ba + \lambda^{-1}bua - \lambda^{-2}babua = \\ &= 1 - \lambda^{-1}ba + \lambda^{-1}b(1 - \lambda^{-1}ab)ua = 1 - \lambda^{-1}ba - \lambda^{-1}ba = 1, \end{aligned}$$

так что $\lambda \notin \text{Sp}(ba)$. \square

Предложение 1.38. *Элемент a^*a положителен при всяком $a \in A$.*

Доказательство. Поскольку a^*a самосопряжен, мы можем расписать $a^*a = b_+ - b_-$ по следствию 1.34. Положим $c := \sqrt{b_-}$, $t := ac$. Заметим, что $f(0) = 0$ для $f(x) = \sqrt{x}$, так что c приближается многочленами от b_- без свободного члена, а значит, $cb_+ = 0$. Имеем:

$$-t^*t = -c(b_+ - b_-)c = b_-^2. \quad (1.6)$$

Следовательно, $-t^*t$ положителен.

Запишем t в виде $t = x + iy$, где x и y самосопряженные элементы A (то есть $x = (t + t^*)/2$, $y = (t - t^*)/2i$). Тогда $t^*t + tt^* = 2(x^2 + y^2)$ является положительным по следствию 1.36. По тому же следствию, видим, что элемент

$$tt^* = (t^*t + tt^*) - t^*t = (t^*t + tt^*) + b_-^2$$

также положителен, то есть $\text{Sp}(tt^*) \subset [0, \infty)$. По лемме 1.37, $\text{Sp}(t^*t) \subset [0, \infty)$, так что t^*t положителен. Но он и отрицателен по (1.6), поэтому $t^*t = 0$ по задаче 29. Значит, $b_- = 0$, поскольку положительный квадратный корень единствен. \square

Следствие 1.39. *Если $b \leq c$, то $a^*ba \leq a^*ca$ для любого $a \in A$.*

Доказательство. Поскольку $c - b$ положителен, то $c - b = d^2$ для некоторого самосопряженного d ; поэтому $a^*(c - b)a = a^*d^2a = (da)^*(da) \geq 0$. \square

Следствие 1.40. *Если a и b обратимы и $0 \leq a \leq b$, то $b^{-1} \leq a^{-1}$.*

Доказательство. Рассмотрим сначала частный случай $b = 1$. Тогда $\text{Sp}(a) \subseteq [0, 1]$. По теореме об отображении спектра, мы видим, что $\text{Sp}(a^{-1}) \subseteq [1, \infty)$, так что $a^{-1} \geq 1$. Перейдем к общему случаю. Поскольку, по следствию 1.39, $b^{-1/2}ab^{-1/2} \leq 1$, то $b^{1/2}a^{-1}b^{1/2} \geq 1$ по первой части доказательства. Умножая это неравенство на $b^{-1/2}$ с обеих сторон и снова применяя следствие 1.39, получаем $a^{-1} \geq b^{-1}$. \square

1.8 Аппроксимативные единицы

Пусть Λ — направленное множество. Семейство $(u_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ элементов C^* -алгебры A называется *аппроксимативной единицей*, если $\lim_\Lambda \|xu_\lambda - x\| = 0$ для $x \in A$ (и, следовательно, $\lim_\Lambda \|u_\lambda x - x\| = 0$). Если A имеет единицу, то можно взять $u_\lambda = 1$ для любого λ , так что это понятие представляет интерес только для алгебр без единицы. В определение аппроксимативной единицы также включают условия $0 \leq u_\lambda \leq 1$ и $u_\lambda \leq u_\mu$ при всяких $\lambda \leq \mu$ из Λ .

Теорема 1.41. *У любой C^* -алгебры имеется аппроксимативная единица.*

Доказательство. Положим $\Lambda = \{a \in A \mid a \geq 0; \|a\| < 1\}$. Порядок на Λ задается \leq . Покажем, что множество элементов Λ , индексированное тавтологическим образом (а имеет индекс a), является аппроксимативной единицей.

Прежде всего, надо проверить, что Λ является направленным множеством, то есть, что для любых двух элементов $a, b \in \Lambda$ найдется такой $c \in \Lambda$, что $a \leq c$ и $b \leq c$. Пусть $f(t) := \frac{t}{1-t}$ и $g(t) := \frac{t}{1+t}$. При этом функция f определена на $[0, 1)$, функция g — на $[0, \infty)$ и $g(f(t)) = t$. Положим $x := f(a)$, $y := f(a) + f(b)$, $c := g(y)$. Поскольку $0 \leq g(t) < 1$, то $c \in \Lambda$. Из неравенства $x \leq y$ следует $1 + x \leq 1 + y$, так что $(1 + x)^{-1} \geq (1 + y)^{-1}$ и

$$a = 1 - (1 + x)^{-1} \leq 1 - (1 + y)^{-1} = c.$$

Аналогично получается $b \leq c$, и направленность множества Λ проверена.

Теперь проверим, что $\lim_{\Lambda} \|x - ax\| = 0$ для всякого $x \in A$. Поскольку по следствию 1.34 каждый элемент разлагается в линейную комбинацию четырех положительных

$$x = \frac{x + x^*}{2} + i \frac{x - x^*}{2i} = \left(\frac{x + x^*}{2} \right)_+ - \left(\frac{x + x^*}{2} \right)_- + i \left(\frac{x - x^*}{2i} \right)_+ - i \left(\frac{x - x^*}{2i} \right)_-, \quad (1.7)$$

то достаточно проверить утверждение для $x \geq 0$. Поскольку для $a \in \Lambda$ имеем $0 \leq 1 - a \leq 1$, то по следствию 1.39, $(1 - a)^{1/2}(1 - a)(1 - a)^{1/2} \leq (1 - a)^{1/2}(1 - a)^{1/2} = 1 - a$. Поэтому (см. задачу 30)

$$\|(1 - a)x\|^2 = \|x^*(1 - a)^2x\| \leq \|x^*(1 - a)x\|,$$

и достаточно проверить, что $\lim_{\Lambda} \|x(1 - a)x\| = 0$ для любого $x \geq 0$ из A , причем без ограничения общности можно считать, что $\|x\| = 1$.

Аналогично предыдущему рассуждению, если $a, b \in \Lambda$ и $a \leq b$ то $\|x^*(1 - b)x\| \leq \|x^*(1 - a)x\|$, так что, при $x \geq 0$,

$$\sup_{b \in \Lambda, b \geq a} \|x(1 - b)x\| = \|x(1 - a)x\|.$$

Поэтому нам нужно показать, что для любого положительного $x \in A$ нормы один и любого $\varepsilon > 0$ найдется такой элемент $a \in \Lambda$, что $\|x^*(1 - a)x\| < \varepsilon$. Положим $a_n := g(nx)$, $n \in \mathbb{N}$ (см. начало доказательства). Тогда $\|x(1 - a_n)x\| = \|h(x)\|$, где $h(t) := t^2(1 - g(nt)) = \frac{t^2}{1+nt}$. Для любого $t \in [0, 1]$ выполняется $0 \leq h(t) \leq \frac{1}{n}$, так что $\|h(x)\| \leq \frac{1}{n}$. Следовательно,

$$\sup_{b \in \Lambda, b \geq a_n} \|x(1 - b)x\| = \|x(1 - a_n)x\| \leq \frac{1}{n}$$

для любого n , поэтому $\lim_{b \in \Lambda} \|x(1 - b)x\| = 0$. \square

Определение 1.42. Аппроксимативная единица называется *счетной*, если множество Λ счетно.

Следствие 1.43. У сепарабельной C^* -алгебры имеется счетная аппроксимативная единица.

Доказательство. Выберем плотную последовательность $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ в A . Тогда найдется такой элемент $a_1 \in A$, $0 \leq a_1$, $\|a_1\| < 1$, что $\|x_1 a_1 - x_1\| \leq 1$ (см. доказательство предыдущей теоремы). Предположим по индукции, что мы уже нашли такие a_2, \dots, a_n , $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$, что для всех $k = 1, 2, \dots, n$ выполнено $\|a_k\| < 1$ и $\|x_i a_k - x_i\| \leq \frac{1}{k}$ при $i = 1, 2, \dots, k$. Теперь найдем такой элемент $a_{n+1} \geq a_n$ с нормой $\|a_{n+1}\| < 1$, что $\|x_i a_{n+1} - x_i\| \leq \frac{1}{n+1}$ при $i = 1, 2, \dots, n+1$. Поскольку последовательность (x_n) плотна в A , то по индукции получаем такую неубывающую последовательность $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ положительных элементов единичного шара, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x a_n - x\| = 0$ для каждого $x \in A$. Действительно, для любого $\varepsilon > 0$ найдем такой элемент x_i , что $\|x - x_i\| < \varepsilon/3$, а для x_i — такой номер j , что $\|x_i a_k - x_i\| < \varepsilon/3$ для всех $k > j$. Тогда для этих k

$$\|x a_k - x\| = \|x_i a_k - x_i + (x - x_i) a_k + x - x_i\| < \varepsilon/3 + \varepsilon/3 \|a_k\| + \varepsilon/3 \leq \varepsilon.$$

\square

Задача 31. Доказать, что обратное неверно: алгебра со счетной аппроксимативной единицей не обязана быть сепарабельной.